CEIG
DB460 2850

Litho 400

16 Leaves letters Press

Letter Press titles

est $1000-1500

Blue - wrapper

Plate 240 damage

contemp calf

backed Board

1842 +

SB
407
L65
1848
SCNHRB

FLORE UNIVERSELLE

PAR LETELLIER,

Docteur-médecin, ex-voyageur-naturaliste du Muséum, membre de plusieurs sociétés d'histoire naturelle, auteur d'une histoire des champignons avec 120 figures, d'un supplément à Bulliard, 108 planches coloriées, d'un avis sur les ressemblances entre les champignons alimentaires et les vénéneux, etc., etc.

PLANTES D'ORANGERIE, DE SERRES FROIDE ET TEMPÉRÉE

UN CAHIER DE 25 FEUILLES PAR MOIS,

noir, 1 fr. 25 c.; colorié, 2 fr. 50 c.; chaque feuille séparée, noire, 5 c.; coloriée, 15 c.

Cette partie d'une Flore générale sera spécialement utile :

1° Aux *Botanistes*, qui y trouveront les caractères et les détails anatomiques aussi complets que possible;

2° Aux *Fleuristes* et aux *Dessinateurs*, qui ont besoin de modèles;

3° Aux *Amateurs d'horticulture*, qui ne craindront plus les descriptions pompeuses et mensongères de quelques marchands, et pourront choisir selon leur goût, sans craindre de coûteuses déceptions ;

4° Aux *Jardiniers*, qui ne voudront pas laisser périr, par ignorance, les fleurs qu'ils sont chargés de soigner;

5° Aux *Horticulteurs*, qui auront des *espèces* nouvelles, rares ou curieuses à faire connaître; car ils y trouveront une publicité considérable et sans frais, puisqu'il leur suffira d'en donner avis (franc de port) à notre bureau, pour voir leur adresse imprimée sur nos feuilles.

Tous les avis concernant le perfectionnement de cet ouvrage sans augmentation de prix seront reçus avec reconnaissance.

Il y aura aussi des cahiers spéciaux pour 1° les plantes *d'agrément* et de *pleine terre*; 2° les *plantes utiles* et *dangereuses*; 3° les *plantes sauvages* ou *flores locales*.

Au Bureau, rue du Faubourg-Saint-Martin, 108.

Et chez MEILHAC, libraire, rue du Cloître-Saint-Benoît, 14.

SAINT-DENIS. — IMPRIMERIE DE PREVOT ET DROUARD.

FLORE UNIVERSELLE

PAR LETELLIER,

Nouvelle édition, entièrement refondue, contenant un Nouveau Dictionnaire de plusieurs centaines d'espèces nouvelles, suivant l'ordre botanique, les observations sur les Ressemblances entre les plantes alimentaires et les vénéneux, etc., etc.

PLANTES D'ORNEMENT, DE SERRES FROIDE ET TEMPÉRÉE

UN CAHIER DE 32 FEUILLES PAR MOIS,

donné à la main, 25 c.; colorié, 2 fr. 50 c.; chaque feuille séparée, noire, 5 c.; coloriée, 15 c.

CAHIER.

Cette partie d'une Flore générale sera spécialement utile :

1° Aux Botanistes, qui y trouveront les caractères et les détails anatomiques aussi complets que possible ;

2° Aux Herboristes et aux Jardiniers, qui ont besoin de modèles ;

3° Aux Médecins d'herboristes, qui ne craindront plus les descriptions pompeuses et trop souvent vides de quelques marchands, et pourront choisir selon leur goût, sans crainte de fausses dénominations ;

4° Aux Jardiniers, qui ne voudront pas laisser perdre, par ignorance, les fleurs qu'ils soignent avec amour ;

5° Aux Horticulteurs, qui aiment des espèces nouvelles, rares ou curieuses à faire connaître ; car ils y trouveront une publicité considérable et sans frais, puisqu'il leur suffira d'en donner avis (franc de port) à notre bureau, pour voir leur adresse imprimée sur nos feuilles.

Tous les avis concernant le perfectionnement de cet ouvrage sans augmentation de prix seront reçus avec reconnaissance.

Il y aura aussi des cahiers spéciaux pour : 1° les plantes d'agrément et de pleine terre ; 2° les plantes vertes et dimorphes ; 3° les plantes grimpantes ou lianes ;

Se vend à PARIS, chez [illegible]

Tige Grimpante d'1 à 2 mètres ligneuse velue
Feuilles opposées, pétiole velu, 5 folioles ovales pointues vert pâle en dessous
Fleurs terminales solitaires larges de 8 à 10 centimètres
6 à 8 pétales obovales pointus violacés

Terre franche, serre froide, eau modérée, de marcottes de boutures de greffes sur la clematis flammula

Clematis azurea sieboldt

Imp lith de Desaillet, Llopis et Cie rue des arcis 17

Chez Martine rue des bourguignons 27



Tige ligneuse rameuse glabre de 60 à 80 centimètres
Feuilles opposées sessiles ovales-lancéolées pointues vert-foncé en dessus, pâles dessous
Fleurs en boule à involucre de 4 folioles très larges, dépassant les fleurs, vert-clair
Corolle à tube velu blanchâtre, long de 2 centimètres, limbe quadrifide rosé

Orangerie, Terre de Bruyères, de boutures et de greffes sur la pimelea drapacea.

Pimelea Spectabilis

Imp. lith. de Desaillet, Lopis et Cie

au Jardin d'hiver des champs elisées

Racine tuberculeuse

Tige rampante à base ligneuse, rameuse, glabre, de 0,60 centimètres
Feuilles alternes, pétiolées, arrondies, à 5 lobes très profonds obovales entiers
Pédoncules axillaires, solitaires, simples, très longs, glabres
Calices vermillons, à 5 lobes arrondis, noirs. 5 Pétales réguliers jaunes.

Serre tempérée, terre franche légère. De graines, de boutures, de tubercules

Tropæolum tricolorum

Lit. de Desaillet rue des arcis 17 chez Thibaut rue St maur 45

Tige ligneuse droite rameuse velue d'1 mètre
Feuilles alternes, pétiolées, ovales amincies aux 2 bouts, velues des 2 côtés
Pédoncules axillaires et terminaux, solitaires, très courts, velus, uniflores
Calices longs. Corolles à 5 lobes aigus réfléchis, rouges. Etamines sans dents

Serre tempérée, terre ordinaire. de graines de boutures de marcottes de Mexico

Cestrum roseum Kunth

Imp. lith. de Desaillet rue des arcis 17

chez Lemichez rue des 3 couronnes 14

Tige ligneuse rameuse droite glabre de 0,30 à 0,45 centimètres
Feuilles alternes, à petiole court, elliptiques très allongées glabres mucronées
Epis de pédoncules axillaires; Bractées petites
Calice à 4 ou 5 sépales, 4 Pétales obovales jaunes, le supérieur à 2 taches rouges

Serre froide, Terre de Bruyères, mi-soleil eau modérée de Boutures

Labichea punctata

Lith de Desaillet, Alopis rue des arcis 17

Chez Thibaut rue St Maur 45

Tige ligneuse droite, de 2 à 4 mètres rameaux nombreux flexibles pendants
Feuilles alternes, à pétiole court rouge velu, ovales pointues. velues surtout en dessous
Panicules terminales de pédoncules velus munis souvent de bractées
Calices presque glabres, Corolles à 5 dents réfléchies rouge laque

Serre tempérée, terre ordinaire, Soleil eau modérée. de Boutures

du Mexique

Habrothamnus elegans

Lith de Desaillet rue des arcis 17

Chez Lemichez rue des 3 couronnes 14

Tige ligneuse rameuse cylindrique haute d'1 mètre droite glabre
Feuilles alternes sessiles ovales obtuses à grandes dents épineuses coriaces
Fleurs en épis avec une petite bractée à la base de chaque pédoncule
Etendard vermillon vif, Ailes pourpres, Carène blanchâtre

Serre froide, Terre de bruyères, peu d'eau. De graines et de boutures sur couche

Chorizema varium

Imp. Litt. Desailler, Hopis rue des arcis 17

chez Martine r. d. Bourguignons 27

Tige ligneuse rameuse d'1 mètre Rameaux cylindriques velus
Feuilles alternes un peu petiolées persistantes glabres
Fleurs à longs pedoncules en ombellules terminales
Ailes beau rouge violacé, Carène à aigrette, Anthères sans poils a la base.

Serre tempérée, Terre franche légère, de graines de marcottes de boutures sur couche chaude

Polygala dalmaisiana

Imp. lith Desaillet, Llopis, rue des arcis 17 au Jardin d'hiver aux Champs Elysées

Racines chevelues
Tige ligneuse arrondie rameuse poilue rougeâtre de 0,45 centim.
Feuilles trois par trois un peu pétiolées elliptiques-allongées épaisses poilues
Fleurs en petites têtes penchées de 2 à 4 fleurs
Calices très velus, Corolle pubescente en cloche l'égalant, Etamines exclusées
Serre froide terre de bruyères demi Soleil de marcottes du cap de B. Esp.

Erica bruniades Linnée

Imp. Lith. de Desaillet, Utopis, rue des arcis 17 au Jardin d'hiver des champs Elisées



Tige ligneuse rameuse d'1 mètre
Feuilles alternes, pétiolées, ovales allongées, amincies aux 2 bouts
Epis axillaires, de 3 à 5 fleurs pétiolées, foliolés au bout
Calice grisâtre, Corolle violette, étendard à cœur blanc.
Serre froide terre franche de marcottes et de boutures . . n^elle hollande

Hovea celsii Bonpland

litt. de Desaillet Llopis rue des arcis 17 chez martine rue des bourguignons 27

Racine rameuse brunâtre
Tige sous-ligneuse à la base, ronde, velue, verdâtre de 0,60 centim. rameaux herbacés
Feuilles opposées sessiles obovales nervées à dents irrégulières espacées
Pédoncules solitaires axillaires très longs velus
Calice velu à 5 dents, Corolle comprimée, vermillon, à 2 lèvres.
Orangerie terre de Bruyères, peu d'eau, mi-soleil, De graines, d'éclats, de boutures

Mimulus cardinalis

Lith. de Desvaillet. Lopin rue des arcis 17



Tige ligneuse ronde rameuse d'1 mètre
Feuilles opposées sessiles ovales-allongées à 3 nervures colonneuses
Pédoncules par trois, terminaux, égalant en longueur la moitié des feuilles
Calice égalant les pétales, 5 Pétales violacés, Style cylindrique
orangerie, terre franche, peu d'eau, Soleil, De graines et de marcottes

Cistus crispus Linnée

Imp. Lith. de Desaillot-Ulpis rue des Amis 17

Racine en tubercules
Tige comprimée bifurquée de 0,45 centimètres
Feuilles en épée alternes sessiles embrassantes glabres à nervures parallèles
Pédoncules terminaux solitaires
Fleurs safranées tachetées de rouge

Serre froide, terre de Bruyères ou franche, soleil, peu d'eau, de graines et d'éclats en mars de la chine

Moraea chinensis thunberg

Lith. de Desailles-Llopis rue des arcis 17

Racine rameuse
vivace
Tige nue simple de 0,30 centim
annuelle
Feuilles toutes radicales
en rosette, ovales ondulées dentées
Pédoncules longs en ombelle terminale de 12 fleurs, Bractées ovales
Fleurs petites pendantes Corolle à 5 lanières retroussées rose-pourpre

Orangerie, terre franche légère, soleil. de graines ou d'Eclats l'automne. D'amérique septentrionale

Gyroselle Dodecatheon meadia Linnée

Lith de Desaillet, Llopis rue des arcis 17

Racine rameuse à fibrilles allongées
Tiges grimpantes grêles striées lisses d'1 à 2 mètres rameuses ligneuses à la base
Feuilles alternes pétiolées en cœur pointu ou en hache
Pédoncules axillaires solitaires égalant les pétioles
Calice à 5 lanières étroites aigues velues Corolle à gorge ouverte, limbe violet
Capsule glabre mince sèche

Serre tempérée, terre franche, soleil, beaucoup d'eau. De graines

De mexico
Maurandia barclayana Lindl.

Imp. lith. de Desaillet, Lopès rue des arcis 17

Tige ligneuse d'1 mètre à 1,50 droite en arbrisseau
Feuilles opposées à 3 folioles pétiolées ovales pointues glabres persistantes coriaces
Pédoncules axillaires et terminaux divisés en 3
Calice en cloche à 5 dents obtuses, Corolle blanche à 5 lanières aigues, odeur suave
Orangerie terre franche, soleil, de graines de marcottes de rejetons . Des açores

Jasminum azoricum Linnée

Lith. de Desaillet, Napis rue des arcis 17

Oignon arrondi à couches concentriques petit
Hampe nue arrondie de 0,20 à 0,30 centimètres de haut
Feuilles engainant la hampe en large gouttière à nervures parallèles
qui de 10 à 20 fleurs pédonculées, terminal. Bractées petites aigues.
Pétales externes jaunes à bord vert, les internes verdâtres à bord jaune 1/3 plus longs

Serre froide, Terre de Bruyères, Demi Soleil, peu d'eau. de cayenne. Cap de Bonne Espérance

Lachenalia luteola Jacquin

Lith de Desaillet Clopis rue des arcis 17

Ognon très gros allongé
hampe nue comprimée de 0,60 centimètres verte
Feuilles s'embrassant les unes dans les autres en courroie pliées en gouttière arquées
Ombellule terminale de 15 à 20 pédoncules très courts, bractées rosées
Corolle régulière à tube long, limbe en cloche blanc rosé avec bandes rouges
Orangerie, terre franche légère, soleil peu d'eau, de cayeux . afrique méridionale

Amaryllis longifolia Aiton

Lith de Desaillet Llopis rue des arcis 17

Tige ligneuse De 0,60 à 1 mètre de haut diffuse Rameaux rudes glanduleux
Feuilles éparses en spatule épaisses obtuses rudes glandulaires
Pédoncules axillaires simples, bi ou trifides longs Fleurs petites
Calices à 5 dents un peu aigues, glanduleux, Corolles blanches inodores
Serre tempérée, Serre franche riche, De marcottes et de boutures

n.lle hollande

Myoporum parvifolium r. Brown

Lith. de Desaillet. Utopis rue des arcis 17

Racines rameuses fibreuses Jaunâtres bisannuelles
Tige Droite ou couchée puis redressée haute de 0,30 cent. ruide herbacée
Feuilles opposées pétiolées ovales à 3 lobes ou pinnatifides dentées glabres
Epis terminaux solitaires lâches, Bractées ouvertes longues velues
Fleurs petites calices verts corolles pourprés
Orangerie, Terre franche, soleil, peu d'eau, de graines de marcottes, de boutures. de la Caroline

Verbena aubletia Jacquin

Imp. lith. de Desaillet Plopis rue des arcis 17

Racine rameuse
Tige ligneuse faible très rameuse d'1 a 1^{mtr},50 rameaux ferrugineux
Feuilles opposées ou par 3 ovales à doubles dents vert-pâle, blanchâtres en dessous
Panicule terminale de pédoncules bi ou trichotomes glanduleux poilus
Corolles jaune-pâle à lèvre inferieure triple de la supérieure et plus foncée
Serre tempérée Terre de Bruyères, mi-soleil peu d'eau. de graines et de boutures Quito

Calceolaria bicolor Ruiz & Pavon.

Lith. de Desaillet-Llopis rue des arcis 17

Racine rameuse
Tige ligneuse à la base droite haute de plus d'1 mètre carrée rameuse
Feuilles opposées petiolées ovales aigues dentées cotonneuses persistantes
Epis terminaux de fleurs opposées ou verticillées pedonculées
Calice comprimé à 2 lèvres, l'inf^re à 2 dents, Corolle double du calice écarlate
Serre tempérée, terre franche légère, soleil, peu d'eau, de graines de boutures caroline floride

Salvia coccinea linnée

Litte de Desaillet Llopis rue des arcis 17

Tige droite ligneuse cotonneuse de 0,60 centimètres Rameaux axillaires
Feuilles opposées sessiles linéaires à bord roulé en dessous blanchâtres cotonneuses
Epi terminal de verticilles ramassés surmonté d'un faisceau de feuilles violacées
Fleurs sessiles Bractées vertes Corolles pourpre foncé
Orangerie, Terre légère, Soleil, peu d'eau, de graines Europe merid. Afrique boréale

Lavandula stœchas Linnée

Lith de Desaillet rue des arcis 17

Tige arborée grosse succulente droite rameuse haute de 2 mètres
Feuilles alternes pétiolées ovales aigues sinuées dentées pubescentes
Pédoncules solitaires axillaires pendants velus
Calice large à dents souvent soudées Corolle orangé vif, Fruit glabre
Serre tempérée, Terre à Orangers. Soleil, beaucoup d'eau, de Boutures. Amérique méridionale

Datura Sanguined Ruiz et Pavon.

Lith. de Desaillet rue des arcis 17

Tige ligneuse droite sans épines d'1 mètre, à rameaux velus
Feuilles alternes pétiolées ovales allongées aigues ondulées entières soyeuses
Panicule ombelliforme de pédoncules velus ramifiés, terminale
Corolles violacées, étamines égales calices velus

Orangerie, terre franche, Soleil eau modérée. De graines sur couche de mexico

Solanum pubigerum Dunal

Lith de Desuillet rue des arcis 17

Tige ligneuse de 0,40 centim. très rameuse cylindrique violacée
Feuilles éparses sessiles linéaires obtuses raides
Fleurs sessiles solitaires dans l'aisselle des ramuscules
Ovaire violacé, calice vert, Corolle rouge-vif

Serre tempérée Terre de bruyères, mi-soleil, eau modérée, de boutures

Lechenaultia oblata

lith. Desaillot r. des arcis 17.

chez Thibaut rue St Maur 45

Racine vivace
Tige droite rameuse grêle cylindrique verte haute d'1 mètre glabre herbacée
Feuilles linéaires lanceolées pointues à bord cartilagineux un peu denté
Pedoncules longs solitaires simples fleurs droites
Calices poilus corolles bleues avec une ligne barbue blanche à chaque lobe

Orangerie ; Terre franche, mi-soleil eau modérée, de graines d'éclats n.lle hollande, Japon

Campanula stricta Sm. gracilis forst

Lith desailler 2 des arcis 17 chez Chauvière rue de la roquette 104

Tige droite rameuse brune lisse glabre
Feuilles 4 par 4 ouvertes lineaires à poils rares et courts
Fleurs terminant les ramuscules solitaires ou 2 à 2 sessiles
Corolles rouges tubuleuses à 4 découpures courtes réfléchies, étamines incluses appendiculées

Serre tempérée terre de Bruyères mi-soleil eau modérée. de boutures et de marcottes. Cap de B. Espérance

Erica ambigua Wendl, *cylindrica* Andr

Lith Desaillet 2 des arcis 17

chez Lemichez, rue des 3 couronnes 14

Tige droite rameuse ligneuse à la base de 0,30 à 0,45 centim. poilue
Feuilles opposées elliptiques pointues incisées-dentées velues vert-pâle dessous
Pédoncules axillaires opposés solitaires, simples, longs, velus
Corolle violet-clair à tube orange

Serre tempérée, terre franche, mi-soleil eau modérée de boutures

Chœnostoma polyantha

Lith. Detaille rue des arcis 17 chez thibaut rue St maur 45



Tige droite rameuse de 2 à 4 mètres grisâtre à poils roux Rameaux pendants
Feuilles alternes pétiolées elliptiques pointues d'odeur vireuse entières
Panicules terminales pendantes, pédoncules courts à bractées petites velues
Calices velus. Corolles tubuleuses à dents non réfléchies, rouges puis orangées

Serre tempérée, Terre franche Soleil beaucoup d'eau, De boutures. De Mexico

Habrothamnus fasciculatus Brogn.

lith. Desailler r. des arcis 17

chez Lemichez r. des 3 Couronnes 14

Tige d'1 Mètre droite rameuse cylindrique verte
Feuilles alternes à long pétiole arrondies à 5 lobes crénelés à poils rares dessous
Pédoncules solitaires axillaires simples poilus plus longs que les pétioles
Pétales obovales grands à limbe rose-briqueté onglet jaune séparé par un arc rouge

Orangerie Terre franche, mi-soleil, eau modérée, de graines d'éclats

Malva lateritia

Imp Lith de Desaillot rue des arcis 17

chez Chauvière r. de la Roquette 104

Tige ligneuse rameuse cylindrique de 0,60 centim. rameaux un peu velus
Feuilles opposées sessiles en cœur aigu à 3 nervures coriaces un peu velues dessous
Pedoncules longs en épi très court terminal
Ailes beau violet, Carène à aigrette, Anthères barbues

Serre tempérée, terre franche légère, de graines de marcottes de boutures sur couche chaude

Polygala cordifolia Thunberg

lith. Desaillet r. des arcis 17

chez thibaut r. St maur 45

Tige ligneuse de 0,60 cent rameuse en touffe serrée, grêle cylindrique
Feuilles alternes a très court pétiole obovales mucronées glabres
Pédoncules courts en têtes terminales, Stipules petites aigues rouges
calices velus, Etendard et ailes mordorés, Carène rouge-laque
Légumes velus

Serre tempérée, terre de bruyères, soleil, peu d'eau. De graines sur couche, de boutures

Pultenæa stricta curtis

lith Desaillot r. des arcis 17.

chez Lemichez r. des 3 couronnes 14

Tige ligneuse sarmenteuse rameuse rude d'1 metre
Feuilles opposées à 3 Folioles ovales en cœur entières ou lobées petites
Pédoncules axillaires solitaires simples longs
Petales blancs au nombre de 6 à 7, Etamines beau violet

Serre froide, terre franche, soleil, eau modérée, de boutures et de marcottes

Clematis bicolor

lith. Desaillot R. des arcis 17

Oignon ovale petit à couches concentriques Pas de Tige
Feuilles radicales à 3 ou 4 folioles obovales Zonées de brun
Ombellules de 5 à 20 fleurs terminant les hampes droites de 0,30 centimètres
Pétales carmin pâle à ongles vert

Chassis, Terre de Bruyères, Soleil, peu d'eau, Du gayeux

Oxalis deppei

Lith. Desaillet R des arcis 17

Racine ou bulbe applatie charnue enveloppée de tuniques
Tige dressée, simple, de 0,60 centim. de haut ferme
Feuilles en épée pointues amplexicaules alternes sessiles
Epis de fleurs sessiles, entourées de bractées courtes obtuses,
Fleurs vermillon-carminé

Serre tempérée, terre de Bruyères, mi-soleil peu d'eau. de cayeux

Watsonia grandiflora

Lith. Desaillet rue des arcis 17

Racines tubéreuses, charnues, brunâtres, vivaces
Tige ligneuse à la base, dressée, carrée, velue, d'1 mètre rameuse
Feuilles opposées pétiolées en fer de flèche dentelées velues pâles dessous
Epis rameux de pédoncules solitaires opposés ou ternés courts
Calices à 3 dents applatis. Corolles à casque comprimé, bleu-d'azur

orangerie, terre de Bruyères, soleil, peu d'eau. De graines de boutures

Salvia patens Cav

lith. Desaillet r. des Orcis 17



Racines Fibreuses rameuses
Tige ligneuse droite d'1 mètre à rameaux grêles pubescents rougeâtres
Feuilles opposées ou ternées à pétiole long, ovales-lancéolées dentées, lisses
Pédoncules axillaires isolés simples longs pendants
Calices très longs rouge-vif, pétales violacés, étamines très saillantes

Serre tempérée, terre de Bruyères, Soleil, beaucoup d'eau, de boutures ... de Mexico.

Fuchsia gracilis Lindley

Lith. Desailler rue des arcis 17

Ognon moyen blanchâtre
hampe nue charnue de 0,30 à 40 centim. tachetée de rouge, bractées aigues
2 Feuilles engainantes, en fer de lance, pointillées de pourpre au bout
épi long, de 20 à 40 pédoncules pendants
Pétales internes echancrés bordés de pourpre, les externes jaunes bordés de vert

Serre froide, terre de bruyères, mi-soleil peu d'eau. de cayeux. du cap de bonne espérance

Lachenalia tricolor jacquin

Lith Desaillet r des arcis 17

Tige ligneuse à la base de 0,30 à 0,60 centim. rameaux nombreux herbacés
Feuilles opposées en bas alternes en haut persistantes pétiolées ovales incisées-dentées
Pédoncules axillaires solitaires simples rapprochés au bout des branches comme en épis
Corolles ponceau-vif Anthères jaunes

Orangerie terre de Bruyères, Soleil eau modérée, de graines de boutures. d'amérique méridionale

hemimeris urticæfolia willdenow.

Lith. Desaillet r. des arcis 17



Racines fibreuses très rameuses traçantes jaunâtres
hampe de 0,40 à 0,60 centim. cylindrique droite portant quelques folioles pointues
Feuilles radicales en courroie à bords et carène lisses, glauques
épi compacte de fleurs nombreuses serrées pendantes à courts pédoncules
Fleurs en massue cylindriques rougeâtres bordées de vert

orangerie, Terre franche legère, Soleil, eau modérée. de rejetons . du Cap de B. espér

Tritoma media Ker

Lith Desaillet r des arcis 17

Tige ligneuse à la base carrée droite de 0,60 centimètres rameuse
Feuilles opposées pétiolées en cœur allongé dentées crénelées, les sup^res sessiles
Pédoncules verticillés par six, courts, formant comme un épi terminal
Calices piquants à leurs 5 dents, corolles assez grandes rouge-éclatant

orangerie, bonne terre légère, soleil, peu d'eau, de graines, de boutures d'éclats. Du chili

Stachys coccinea jacquin

Lith Desaillet rue Des arcis 17

Tige dressée cylindrique très rameuse glauque ligneuse d'1 à 2 mètres
Feuilles alternes pétiolées ovales-pointues vert sombre glauques
Panicules terminales de fleurs nombreuses
Corolles longues renflées à la gorge jaunes

Orangerie, Terre ordinaire, soleil, beaucoup d'eau, de graines de boutures de Buenos-ayres

Nicotiana glauca Botanical mag

Lith. Desaillet r. des arcis 17

Racine fibreuse rameuse
Tiges nombreuses ligneuses à la base simples droites de 60 centim. velues
Feuilles opposées (rarement alternes) pétiolées en ovale aigu, à dents obtuses
Panicule terminale, bractées en alène
Calice commun velu corolle en tube violet clair

Orangerie, terre franche, soleil eau modérée, d'éclats. Virginie caroline
Célestine Eupatorium celestinum Linnée

Lith. Desaillet r. des arcis 17

Tige ligneuse droite rameuse d'1 mètre lisse
Feuilles alternes pétiolées ovales aigues dentées glabres
Pédoncules axillaires solitaires simples longs
Calice court. Corolle vermillon en dehors, jaune en dedans

Orangerie, terre de bruyères, mi-soleil; de graines et de boutures

Siphocampylos bicolor

Lith Desaillet R des arcis 17

Racine rameuse
Tige bisannuelle ou vivace un peu ligneuse à la base, rameuse de 45 centimèt
Feuilles alternes pétiolées ovales, pointues, dentées irrégulièrement glabres
Panicules terminales, à petites bractées,
Fleurs petites en tubes bleu violacé

Orangerie, terre franche, Soleil eau modérée. De graines dès la maturité, de boutures. Sardaigne afrique Bor

Trachelium coeruleum Linnée

Litte Desaillet r des arcis 17

Tige en arbre droite rameuse de 2 à 3 mètres
Feuilles alternes pétiolées ovales-oblongues un peu velues dessous dentées persistantes
Épis rameux terminaux velus sans bractées
Pétales d'un blanc-rosé d'odeur suave

Orangerie Terre à orangers Soleil eau modérée, De graines sur couche de marcottes . De madère

Clethra arborea Aiton

Lith Desaillet r. des arcis 17

Tige en arbre de 3 à 5 mètres glabre rameuse, rameaux velus rouges
Feuilles alternes à pétiole rouge ovales dentées glabres coriaces persistantes
Panicules terminales pendantes lisses
Fleurs rouges ou blanches, quelque fois doubles
Fruits semblables à des fraises d'un gout fade.

Serre froide, Terre franche, Soleil, de graines sur couche tiède, de marcottes midi de l'europe

Arbre aux fraises. *Arbutus unedo* Linnée

Lith. Desaillet R. Des arcis 17

Tiges ligneuses droites glabres de 2 mètres à rameaux pubescents
Feuilles opposées et éparses en lance pointues entières glauques
Ombellules axillaires pendantes pédonculées
Fleurs blanches, 5 cornets sur les étamines

Serre tempérée terre légère, Soleil eau modérée, de graines sur couche, d'éclats du cap de B. espér

Asclepias fruticosa Linnée

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse à la base rameuse d'1 mètre
Feuilles alternes sessiles un peu embrassantes ovales pointues à grandes dents
Pédoncules axillaires bi ou trifides formant comme une panicule terminale
Corolles violacées en dedans rougeâtres en dehors

Orangerie, Terre franche légère, mi-soleil, peu d'eau, de graines sur couche, et d'éclats.

Pentastemon argutum

Lith Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse à la base à rameaux herbacés velus
Feuilles 3 par 3 petiolées ovales pointues, dentées, rougeâtres en dessous
Pédoncules axillaires, solitaires simples velus
Corolle à tube long, courbé, rougeâtre, limbe d'au moins 5 centimètres, violet.

Serre tempérée, terre franche légère, soleil, eau modérée De graines, d'éclats de boutures

Achimenes longiflora.

Lith. Desaillet R. des Arcis 17

Chez Lemichez R. des 3 couronnes 14

Tiges rameuses, cylindriques, à poils roides, de 30 à 50 centimètres
Feuilles opposées à pétiole court, elliptiques, dentées, poilues, les supérieures arrondies
Pédoncules entre les feuilles, solitaires, entiers, courts, tournés du même côté de la tige
Calice violet-foncé, 2 Pétales supérieurs vermillons, les inférieurs en écailles très velues violettes

Serre tempérée, terre franche légère, soleil, de graines et de boutures au printemps. Du Mexique.

Cuphæa miniata Brongniart

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez bertrand R. de la Roquette 102

Tige ligneuse à la base, rameuse, cylindrique, velue, de 30 à 45 centimètres
Feuilles opposées, à pétiole court, ovales-lancéolées, dentées,
Pédoncules axillaires, simples, 2 par 2, velus.
Corolle violette, à gorge plus pâle, mouchetée de foncé

Serre tempérée, terre de Bruyères, Soleil

De Boutures

Angelonia Speciosa

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Chez thibaut R. St maur 45

Tige ligneuse, velue, rameuse, de 60 à 80 centimètres
Feuilles opposées, pétiolées, elliptiques pointues, à poils rares, entières
Panicules en boule, terminales, à pédicelles velus, bractées lancéolées
Calices à 1 ou 2 grandes dents, velus, Corolles à limbe rose, gorge velue

Serre tempérée, Terre franche légère,

de graines, de Boutures.

Sipanea carnea

Lith. Desailly R. des arcis 17

Chez Lemichez R. des 3 couronnes 14

Tigé ligneuse, cylindrique, rameuse, glabre, de 40 à 50 centimètres
Feuilles alternes, sessiles, lineaires-lanceolées pointues, glabres, entières
Epis ou Panicules de 4 à 8 Fleurs, latéraux et terminaux
Pétales azur foncé, anthères conniventes

Serre Tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de Boutures

Billarderia (Sollya) Salicifolia

Lith Desaillet R des arcis 17

Chez Chauvière R de la roquette 104

Tige faible volubile de 50 à 60 centimètres verte glabre
Feuilles alternes, pétiole long, 3 folioles en lance en haut obcordées en bas, pétiolules très courts velus
Têtes de 6-10 fleurs à pédoncules velus, axillaires et terminaux
Etendard vermillon, ailes carmin, carène noirâtre
Légume glabre
Serre tempérée, Terre franche, mi-soleil, peu d'eau, de graines de boutures. Nelle hollande

Kennedia coccinea Ventenat

Lith. des'aillet R. des arcis 17 Chez Thibaut R. St maur 45

Tige ligneuse, rameuse, cylindrique, droite ferme, glabre, de 60 à 80 centimètres
Feuilles alternes de 19 à 25 folioles opposées sessiles, obovales
Epis axillaires droits, pédoncule glabre de 8 à 10 centimètres, bractées plus courtes que les pédicelles
Etendard pourpre-violet à 2 taches blanches, ailes et carène pourpres

Orangerie, terre franche légère, Soleil, eau modérée, De graines et de boutures

Swainsonia purpurea

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Chez Thibaut R. St Maur 45

Tige ligneuse, très rameuse, arrondie, glabre, d'1 mètre.
Feuilles opposées, pétiolées, elliptiques, pointues, dentées, glabres.
Panicules terminales, très larges, en boule.
Pétales et involucres (fleurs stériles) roses

Orangerie Terre de Bruyères. mi-soleil eau modérée. de boutures

hydrangea japonica

Lith. Josaillet R des ancis 17

Chez Bertrand R de la Roquette 102

Tige ligneuse droite rameuse cylindrique
Feuilles alternes à peine pétiolées ob-ovales lancéolées, glabres
Epis axillaires de 6 à 8 fleurs à pedicelles longs, bractées courtes aigues
Etendard et Ailes jaune-fauve rayés de rouge, Carène brune

Serre tempérée, terre franche légère, mi-soleil, de boutures

Daviesia-lanceolata

Lith. Desaillet R. des arcis 17

chez Lemichez R. des 3 couronnes 14

Tige droite ligneuse très rameuse formant boule rameaux violacés
Feuilles opposées à court pétiole violacé, ovales-longues pointues glabres
Pédoncules axillaires solitaires opposés simples plus courts que la feuille
Pétales blancs tachés de rose

Orangerie, Terre de Bruyères, Soleil, beaucoup d'eau, de graines de boutures

Myrtus tenuifolia

Lith. Desaillet R des arcis 17

Chez Thibaut rue St maur 45

Tiges ligneuses en arbrisseau rameuses, formant buisson.
Feuilles opposées à pétiole court, en cœur pointues glabres, glauques en dessous
Epis terminaux de fleurs verticillées, bractées grandes, ciliées, pourprées
Corolles blanc-rosé

Pleine terre ordinaire, orangerie à -6°, soleil, de graines, de marcottes de boutures monts Emodi

Leycesteria formosa wallich

Lith Desaillet R des arcis 17

Tiges ligneuses rameuses de 50 centimètres rameaux trigones pubescents
Feuilles ternées ovales-oblongues, pointues, pubescentes en dessous
Panicules trichotomes terminales un peu en boule
Calice court, Corolle presque cylindrique pourpre

Serre tempérée, terre franche légère, Soleil, peu d'eau, De boutures ou de marcottes sur couche chaude. de Mexico.

houstonia coccinea Andrews

Lith. desaillet R des arcis 17

Tige couchée à la base seulement, rameuse, herbacée au sommet
Feuilles opposées sessiles ovales à très grosses dents
Epis terminaux, droits, de fleurs sessiles nombreuses, serrées
Corolles blanchâtres à odeur douce

Serre froide, soleil, eau modérée, de graines et de boutures. Terre franche légère

Verbena teucrioïdes

Lith. Desaillet R. du Arcis 17

Tige ligneuse droite rameuse cylindrique d'1 à 2 mètres
Feuilles opposées et ternées elliptiques-longues, pointues, à pétiole court.
Epis terminaux pendants, à pédicelles courts, bractées courtes en spatule
Calices cylindriques de 8 centimètres, vermillon-foncé, pétales obovales de même couleur

Serre tempérée, Soleil beaucoup d'eau, terre de bruyères, de graines et de boutures du pérou

Fuchsia corymbiflora Ruiz et Pavon

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Racine vivace rameuse jaunâtre
Tige ligneuse en bas, herbacée dans tout le reste, rameuse, droite, de 60 centimètres
Feuilles alternes ailées à 5 ou 7 folioles pinnatifides-dentées
Pédoncules axillaires et terminaux formant la panicule ou le corymbe
Fleurs larges de 20 à 30 centimètres, très doubles, très blanches

D'éclats en automne, qu'on rentre l'hiver en serre tempérée, et remet en pleine terre l'été. Soleil.

Mandiane . Matricaria parthenoïdes h.p.

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse grimpante rameuse de 2 à 5 mètres
Feuilles opposées, pétiole terminé par des vrilles, 4 pinnules de 3 à 4 foliolés en cœur dentés
Epis opposés aux feuilles pendants longs, à petites bractées, et pédicelles très-longs
Fleurs en tube bossu, vermillon-foncé

Serre tempérée, Soleil, peu d'eau, de graines en terre ordinaire *du Chili*

Eccremocarpus, Scaber Ruiz et Pavon.

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse droite rameuse de 60 centimètres blanche cotonneuse
Feuilles alternes pinnatifides à lobes arrondis à 3 ou 4 dents, blanches cotonneuses dessous
Panicule en corymbe de fleurs nombreuses
Calice très cotonneux, Corolles toutes jaunes

Orangerie l'hiver, Pleine terre légère l'été, soleil, peu d'eau, de graines, de marcottes, de boutures. midi de l'europe

Cineraria maritima Linnée ♃

Lith. Desaillet R des arcis 17.

Tige ligneuse, droite, rameuse de 1 à 2 mètres cylindrique, rameaux carrées
Feuilles opposées un peu petiolées, elliptiques-longues, pointues, dentées, rudes, persistantes
Verticilles de fleurs sessiles formant des épis simples, terminaux, Bractées courtes
Calice prismatique glabre à dents courtes recourbées. Corolles longues aurores

Orangerie, Soleil, peu d'eau. De graines, de boutures, terre franche légère du Cap de Bonne espérance

Queue-de-lion. Phlomis leonurus Linnée

Lith. des ail. et R. des arcis 17.

Oignon déprimé compacte
Tige droite ferme herbacée simple d'1 mètre
Feuilles engainantes alternes fermes en épée
Epi de 15 à 20 fleurs alternes se courbant toutes d'un même coté
Fleurs rosées-violacées

Pleine terre légère dès avril, rentrer en orangerie en octobre. mi-Soleil, peu d'eau. De Cayeux

Gladiolus floribundus

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse droite de 50 à 60 centimètres, rameaux ligneux nombreux en tête
Feuilles éparses sessiles en spatule très entières, glabres coriaces épaisses persistantes
Epis terminaux courts formant corymbes
Pétales très blancs, ceux du dehors du corymbe plus grands que les autres.

Orangerie terre ordinaire. Soleil eau modérée de boutures de Sicile

Thlaspi. Iberis sempervirens Linnée

Lith. Desailler R. des arcis 17

Racine rampante rameuse
Tiges tortueuses un peu ligneuses simples de 60 centimètres
Feuilles engainantes alternes en épée, à bords et carène aiguillonnés, persistantes
Panicule terminale, longue, lâche, étagée,
Corolle beau bleu, Etamines à connectif renflé, jaune, Anthères verdâtres.

Serre tempérée, terre substantielle, mi-soleil, eau modérée, d'éclats, de boutures. Nouvelle hollande

Dianella cœrulea simson.

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Racines nombreuses fibreuses
Tige très courte grosse, charnue
Feuilles alternes embrassantes, ovales longues aigues à verrues nombreuses des 2 cotés
Epi très long de fleurs pendantes
Fleurs courbées rouges à la base, vertes au sommet

Orangerie. Terre sableuse, soleil, peu d'eau, de graines de rejetons. Cap de bonne espérance

Aloë verrucosa. Linnée

lith desaillet R des arch. 7

Tige charnue vivace anguleuse dentée de 40 à 50 centimètres
pas de Feuilles
Pédoncules solitaires simples
Corolle brunâtre tachée de plus foncé, gorge élevée en cercle, languettes bifides

Serre tempérée, terre forte, soleil, peu d'eau. de boutures sur couche chaude. Cap de bonne espérance

Stapelia variegata Linnée

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse droite de 2 à 3 mètres, rameaux cotonneux nombreux
Feuilles alternes à pétiole court, elliptiques pointues dentées, soyeuses en dessous
Panicules axillaires en pyramide, de fleurs nombreuses petites
Calice glabre, 3 à 6 demi-fleurons grisâtres, fleurons jaunes.

Orangerie, terre légère, soleil, eau modérée, de rejetons de boutures — Terre de Diemen

Aster argophyllus Labillardière

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige droite ligneuse à la base, rameuse, d'1 mètre
Feuilles opposées, sessiles, en lance, très pointues, très entières.
Pédoncules axillaires et terminaux bi ou trifides, formant une panicule lâche.
Calice aigu, Corolle rouge-brun.

Orangerie ou pleine terre couverte, terre legère, mi-soleil, de graines ou d'éclats de Mexico

Pentastemon gentianoïdes humboldt

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse droite rameuse, d'1 à 2 mètres
Feuilles alternes pétiolées à 5 ou 7 lobes profonds pointus, à dents très inégales
Fleurs axillaires à très longs pétioles simples solitaires, pendants.
Calice à poils en étoile, pétales jaune-rougeâtre rayés de rouge-brun.

Serre tempérée. Terre franche. Soleil, beaucoup d'eau. De boutures

Abutilon venosum

Lith Desaillet R des arcis 17

Chez Bertrand R de la Roquette 102

Racine bisannuelle
Tige herbacée, étalée, rameuse
Feuilles alternes, sessiles, pinnatifides, à lobes inégaux, linéaires, un peu dentés
Pédoncules axillaires simples allongés
Corolle presque régulière, bleuâtre

Orangerie, Terre de Bruyères mélangée de terre franche, mi-soleil, de graines et de boutures. N.lle hollande

Isotoma axillaris Lindley

Lith. Desaillot R des arcis 17

Chez thibaut R St maur 45

Tige droite ligneuse rameuse cylindrique, rameaux velus
Feuilles alternes un peu pétiolées, elliptiques, allongées, grandes
Pédoncules en épis courts simples terminaux.
Ailes rouge-violacé. Carène à aigrette, Anthères sans poils à la base

Serre tempérée, terre franche légère. de graines, de marcottes, de boutures

Polygala laurifolia

Litho Desailler R des arcis 17. chez Lemichez R des 3 Couronnes 14

Tige très courte épaisse Droite Simple,
Feuilles très rapprochées, paraissant radicales, pétiolées, rhomboïdales, à bords cartilagineux
hampe Droite de 10 à 15 centimètres terminée par une paniculle à pédicelles anguleux
Calice Sec, violet, pétales blanchâtres

Serre tempérée, terre de bruyères, Soleil, peu d'eau, De graines, D'éclats, De boutures

Statice puberula

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Chez Chauvière R. de la Roquette 104

Tige ligneuse droite rameuse d'1 mètre un peu velue
Feuilles opposées, pétiolées, grandes, elliptiques pointues aux 2 bouts
Panicules terminales, ramassées en boule allongée, de fleurs sessiles
Corolle grande, rose-carné, anthères éloignées

Serre tempérée, Terre de bruyères, plein soleil, beaucoup d'eau; de Boutures

Justicia carnea Bot. reg.

Lith. Desaillet R. des amis 17

Chez Bertrand R. de la Roquette 102

Tige ligneuse cylindrique glabre rameuse de 30 centimètres
Feuilles opposées à pétiole très court, elliptiques allongées, très entières, glanduleuses.
Fleurs solitaires, terminant les rameaux
Calices obtus, sans glandes, pétales jaunes, 5 styles

Orangerie, Terre franche légère, Soleil, peu d'eau. De Boutures

Hypericum nepaulense

Lith. Desaillet R. des arcis 17 chez Chauvière R. de la Roquette 104

Tige ligneuse droite, rameaux, herbacés, velus.
Feuilles alternes à pétiole très court elliptiques-pointues dentées, à poils glanduleux
Fleurs solitaires, terminant des ramuscules axillaires. Bractées velues
Calice glanduleux, Corolle tubuleuse à limbe évasé, écarlate

Serre tempérée, terre de bruyères mélangés, Soleil, eau modérée, de Boutures

De mexico.

hoitzia coccinea

cavanilles

Lith. desaillet R. des arcis 17

Chez Chauvière R. de la Roquette 104

Tige ligneuse, dressée, très rameuse glabre de 60 centimètres
Feuilles verticillées par 6, rapprochées, triquètres ciliées
Têtes terminales de 6 à 10 fleurs. Corolle en ampoule rose mouchetée de rouge
Anthères incluses sans appendices

Serre froide, terre de bruyères, mi-Soleil, eau modérée, de graines, de marcottes

Erica depressula (voyez les notes)

Lith. Desaillet R des arcis 17

Jardin d'hiver aux champs élisées

Tige ligneuse à la base, rameuse, droite
Feuilles alternes à 3 ou 5 folioles entières ou à grandes dents
Epis opposés aux feuilles, pédoncules courts, bractées étroites, pointues
Calice à 5 lanières aigues, Corolle grande, rose, Etamines courtes

Serre tempérée, Terre franche, Soleil, eau modérée, de boutures,

Amphicome arguta

Lith Desaillet R des arcis 17

Chez Chauvière R de la Roquette 104

Tige ligneuse droite rameuse de 60 à 80 centimètres
Feuilles éparses à pétiole très court en épée roïdes ciliées, persistantes
Panicules en corymbes, terminales, petites
disque périgyne à 5 lobes, pétales glabres, blanc-rosé, en étoile

Serre froide, Terre de bruyères, mi-soleil, eau modérée, de graines, de marcottes de boutures. du Cap

Diosma ericoïdes (Linné !)

Lith. detaillet R des arcis 17

Chez Thibaut R St maur 45

Racine fibreuse, rameuse,
Tige très courte, rameuse, ferme, brunâtre, couchée.
Feuilles ramassées, persistantes, en spatules longues, ou tri-pinnati-fides, blanches dessous
Pédoncules longs terminés par une fleur
Fleur large de 7 à 8 centimètres aurore-foncé, base des ½ fleurons tachée de blanc sur fond noir

Orangerie sèche. Terre légère, Grand soleil, beaucoup d'eau l'été. de graines de boutures, d'éclats

Gazania rigens du cap de bonne espérance rob. Brown

Lith Descaillet R des arcis 17

Ognon assez gros lisse jaunâtre
hampe nue cylindrique lisse, de 30 centimètres
Feuilles toutes radicales en larges courroies, molles, ondulées, ciliées.
Epi terminal conique, régulier, court. Bractées lanceolées, longues.
Corolles planes bleues, Anthères blanc sale.

Chassis, Terre légère, soleil, peu d'eau, de graines et de cayeux du Portugal, nord de l'afrique

Scilla peruviana Linnée

Lith desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse rameuse d'1 mètre
Feuilles opposées, pétiolées, ovales, dentées, persistantes, velues en dessous
Ombellules à long pédoncule, Axillaire, Bractées lineaires courtes
Corolle d'abord jaune puis aurore, d'odeur désagréable

Serre tempérée. Soleil, beaucoup d'eau, terre franche, de graines de boutures. Amérique mérid.

Camara Lantana camara Linnée

Lith. desaillet R des arcis 17

Racine conique fibrilleuse
Tiges ligneuses à la base, presque simples, dressées, de 0,50 centimètres
Feuilles opposées, amplexicaules, elliptiques-longues, à dents très fines.
Panicule en corymbe, terminale de petites fleurs.
Calice tubulaire, 3 demi-fleurons oranges, plusieurs fleurons jaunes. odeur d'anis

Orangerie, Terre ordinaire, Soleil, eau modérée. De graines. Du Chili.

Tagetes lucida. Cavanilles.

Lith. Desailler R des arcis 17



Tige ligneuse, droite, effilée, très rameuse d'1 à 2 mètres
Feuilles imbriquées, très courtes, charnues, recouvrant entièrement les rameaux
Fleurs solitaires sessiles terminales et axillaires nombreuses
Corolles tubulaires blanches.

Orangerie, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. De Boutures. Du Chili

Fabiane . Fabiana imbricata
ruiz et pavon

Lith. Desaillet R. des arcis 19

Tige ligneuse, droite, rameuse, velue, de 0,50 centimètres
Feuilles opposées et éparses, sessiles, en spatule, dentées au sommet ou entières
Paxicules terminales ramassées de fleurs très nombreuses, petites
Corolles rouges, aigrette à 5 arêtes ?

Orangerie. Terre ordinaire, Soleil eau modérée : de graines et d'éclats Nouvelle Espagne

Stevia purpurea. Lagasca.

Lith. Desaillot R des arcis 17

Tige ligneuse rameuse couchée de 0,60 centimètres
Feuilles alternes en Spatule, entières, persistantes, à Duvet soyeux
Panicules terminales de peu de fleurs rapprochées.
Calices velus Corolles blanches lavées de rose

Orangerie, Terre franche légère, mi-soleil, peu d'eau, De graines de boutures. Espagne

Liseron Satiné Convolvulus cneorum Linnée

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse grimpante rameuse de 2 à 3 mètres
Feuilles alternes à long pétiole, volubile, en cœur lobé, incisé crénelé et denté
Pedoncules solitaires axillaires, simples, longs, velus
Calice velu Corolle grande rose avec 2 lignes barbues, jaunes.
Capsule pubescente, graines ailées
Serre tempérée, Terre substantielle, Soleil, eau modérée, de graines de boutures. Du mexique.

Lophosperme, Lophospermum Scandens

Botanic. magas.

Lith Desaillot r. des arcis 17

Tige charnue sphéroïdale profondément cannelée à rangées de tubercules épineux
Pas de feuilles
Fleurs isolées sessiles sortant des tubercules
Tube écailleux vert, Pétales blancs
Serre tempérée, Terre de Bruyères, Soleil, peu d'eau, de rejetons

Cactus (Echinopsis) sulcatus

Lith Desaulles R des arcis 17

Tige ligneuse, très rameuse, droite, de 0,50 centimètres
Feuilles éparses, en alène, glabres, ponctuées
Fleurs solitaires, sessiles axillaires, ou dans la dichotomie ou au bout des rameuscules
Corolles glabres, vermillon-pourpre

Serre tempérée, Terre de Bruyères riche, mi-soleil, eau modérée. De Boutures. N.lle Hollande

Lechenaultia formosa Robert Brown

Lith Desailler R des arcis 17

Tige un peu couchée, ligneuse très rameuse, rude, de 0,45 centimètres
Feuilles opposées à pétiole court, elliptiques, entières, rudes, persistantes.
Pédoncules terminant des ramuscules axillaires, solitaires, simples, très longs
demi-fleurons (rayon) bleu céleste, Fleurons (disque) jaunes

Orangerie, Terre légère substantielle. mi-soleil, eau modérée. de graines, de rejetons de boutures. du cap

Agathée. Cineraria amelloïdes Linnée

Lith Desaillet R des arcis 17

Tiges nombreuses, ligneuses à la base, simples, droites, poilues, de 0,60 centimètres
Feuilles opposées, sessiles, en lance, pointues, entières.
Panicule terminale
Corolle blanche, lavée de bleuâtre au centre

Orangerie, terre franche, soleil, beaucoup d'eau, d'éclats, de boutures.

Phlox omniflora

Lith. Desaillot Rue des arcis 17

Racine vivace rameuse
Tiges herbacées, droites pubescentes de 0,50 centimètres
Feuilles en lance alternes sessiles pubescentes, à bords roulés en dessous
Epis terminaux simples
Fleurs très grandes, beau rouge pubescentes

Orangerie, Terre franche, mi-soleil, eau modérée, de graines sur couche, d'éclats. De mexico

Lobelia fulgens willdenow

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse à la base, droite, rameuse, glabre, arrondie, de 0,60 centimètres
Feuilles sessiles glabres, les supérieures en lance, les inférieures en Spatule.
Panicule terminale à pedoncules penchés
Corolles écarlates, à levre inferieure couverte de poils dorés et de lignes rouges

Orangerie, Terre franche, de graines Sur couche ou d'éclats, Soleil, eau modérée. De mexico

Chelone barbata Cavanilles

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tiges ligneuses rameuses, droites
Feuilles opposées, à pétiole court, presqu'en cœur, pointues, dentées, rudes.
Panicule terminale, lâche, peu fournie,
Calice simple, à fleurons assez nombreux, blanc rosé

Serre froide, Terre legère, Soleil, peu d'eau. de graines de boutures

Eupatorium rugosum.

Imp. Desaillet R des amis 17

Tige ligneuse à la base, dressée, rameuse, glabre.
Feuilles opposées, à pétiole court, lanceolées, pointues, glabres, dentées
Epi terminal
Calice à lanières aigues, Corolle assez grande, violette

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de graines et de boutures.

Jasenia fimbriata

Lith Desaillet R des arcis 17 Chez Chauvière R de la Roquette 104

Tige ligneuse, peu rameuse, dressée, glabre, rouge
Feuilles opposées à pétiole court, ovales pointues, dentées, rougeâtres en dessous
Pédoncules axillaires, solitaires, simples, portant de petites bractées
Corolle prolongée en éperon à la base, à limbe large, rouge

Serre tempérée, Terre franche légère, Soleil, eau modérée, De graines, d'éclats, de boutures

Achimenes grandiflora

Lith. Desailliet R. des arcis 17

Chez Lemicher R. des 3 Couronnes 14

Racine rameuse
Tige très courte grosse dressée
Feuilles très rapprochées obovales très grandes fermes entières glabres
hampe nue dressée de 60 centim. terminée par une panicule très fournie.
Calices verts à la base, rouges au milieu, violets au bord. Pétales très courts

Serre tempérée terre franche, soleil de graines, d'éclats, de marcottes Iles canaries

Statice macrophylla willden

Lith. de Saillet R. des arcis 17 Chez Bertrand R. de la Roquette 10.

Racine vivace
Tige herbacée, dressée, rameuse, poilue, portant des aiguillons, de plus d'1 mètre
Feuilles alternes à long pétiole, de 5 à 7 folioles ovales-pointues digitées glabres
Epi terminal, à longs pétioles, bractées en cœur, un peu pétiolées.
Pétales roses
Silique à long support
Orangerie, Terre franche, Soleil, beaucoup d'eau. de graines et d'éclats. Indes occidentales

Cleome Spinosa Linnée

Litho Desaillet R des arcis 17

Chez Chauvière R de la Roquette 104

Tige ligneuse à la base, rameuse, dressée de 0,40 centimètres
Feuilles opposées finissant en pétiole en lance aigues, très dentées
Pedoncules axillaires solitaires, simples, longs
Corolle violet-foncé, gorge blanche, mouchetée de brun-violet.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, Soleil, eau modérée

De Boutures

Angelonia grandiflora

Lith desaillet R des arcis 17

Chez Chauvière R de la Roquette 104

Tige ligneuse, rameuse, cylindrique, de 0,40 centimètres
Feuilles opposées, quelquefois ternées, pétiolées en cœur
Pédoncules en épis terminaux simples, bractées de l'axe longues, celles du pédoncule petites
Calice prolongé en éperon, rouge en bas, jaune au bord, Pétales noirâtres

Serre froide, Terre ordinaire, mi-soleil, eau modérée, de graines et de boutures, Amérique méridionale

Cuphea strigulosa. Kunth

Lith. Desaillist R. des amis 17

Chez Bertrand R. de la Roquette 102



Tige ligneuse rameuse de 1 à 2 mètres
Feuilles alternes, à 3 folioles ovales-longues entières, à court pétiole bracteolé à sa base
Fleurs axillaires de fleurs bi ou trigéminées, penchées
Calices à dents aigues, bractéoles à la base. Corolle écarlate.

Serre tempérée terre franche légère, Soleil eau modérée. De boutures

Dioclea glycinoïdes

Litt. des ailles R des arcis 17

chez martine R des bourguignons, 27

Tige ligneuse à la base, rameuse, velue, de 0,20 centimètres
Feuilles alternes, sessiles, en spatule, entières, velues, petites.
Pédoncules solitaires axillaires, simples, longs
Calices à dents aigues, poils glanduleux, Corolle à tube jaune, limbe noir-violacé

Serre tempérée, terre franche légère, soleil, eau modérée, De boutures

Nierembergia intermedia

Lith. Desaillet R des arcis 17

Chez Chauvière R de la Roquette 104

Tige ligneuse à la base, velue, très rameuse, couchée, puis redressée
Feuilles alternes, sessiles, en lance, ondulées, velues.
Epis terminaux, rameux, d'abord roulés en crosse, à fleurs sessiles sur 2 rangs du même côté.
Corolles en entonnoir, poilues en dehors, à 5 dents arrondies, violettes.

Serre tempérée; Terre ordinaire, Soleil, beaucoup d'eau. De graines, de Boutures.

Tournefortia heliotropioïdes

Lith. Desailler R. des arcis 17

Tige ligneuses, mince, très rameuse, à poils courts, droite, de 1 mètre
Feuilles presqu'opposées, en spatule, entières, petites, coriaces.
Épis terminaux, s'allongeant pendant la floraison. bractées moyennes.
Corolle à long tube, à 5 divisions obtuses, violettes

Orangerie tout fromme, très légère, mi-soleil, eau modérée. de graines de boutures

Pelago gillesii

Lith. Desailler R. des Arcis 17

Chez Martine R des Bourguignons 27

Tige ligneuse dressée rameuse brunâtre de 0, 60 centimètres
Feuilles quaternées glabres, à pétiole très court, ouvertes, linéaires.
Pédoncules axillaires simples, formant comme un épi tourné d'un côté.
Calices roses sans bractées. Corolle en cloche, Anthères sans appendice, exclusses

Serre froide, Terre de Bruyères. mi-Soleil, eau modérée. de graines de marcottes. Europe méridionale

Erica mediterranea Linnée

Lith. Desaillot R des arcis 17

Racine rameuse vivace brunâtre
Tiges herbacées dressées peu ou point rameuses poilues anguleuses de 50 centim
Feuilles alternes sessiles ovales pointues, ruides, glabres, à dents inégales
Pédoncules axillaires, solitaires, simples, velus, formant un épi terminal.
Calice à lobes dentés, prolongés en bas, Corolle courte bleue, 2 bosses à la lèvre infre

Orangerie terre franche, mi soleil, beaucoup d'eau. de graines d'éclats. d'Amérique septentrionale

Lobelia Syphilitica Linnée

Lith. Deraillet R des arcis 17

Ognon volumineux jaunâtre
Tige nue, charnue, sortant du milieu des feuilles, verte tachée de brun, de 0,30 centim.
Feuilles partant de l'ognon, s'emboitant, ovales longues, ondulées,
Epi terminal de fleurs nombreuses, rapprochées, pendantes.
Fleur à 6 dents arrondies, non réfléchies, longue, en tube, rose tachée de pourpre.

Serre froide, Terre franche, légère, Soleil, peu d'eau, de cayeux en automne. Cap de bonne espérance

Veltheimia capensis Redouté.

Lith. Desaillet & des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, haute de 2 mètres, cylindrique
Feuilles alternes, à peine pétiolées, ovales-pointues ou en lance, grandes, glauques.
Panicules terminales, lâches
Corolles bleu-violacé moyennes

Serre tempérée ou pleine terre couverte. Terre ordinaire, mi-soleil, passablement d'eau, de graines

Solanum glaucophyllum h. p.

Lith. Desaillot R. des arcis 17

Tige très courte formant une grosse *souche* (Rhizoma) charnue, *simple*,
Feuilles ramassées près de la racine, *Sessiles*, épaisses, ovales, épineuses au bord, tuberculeuses dessous
hampe centrale, Dressée, à bractées nulles, terminée par un épi de 20 à 30 fleurs
Corolle a lobes obtus, égaux, rouge, à bord vert

Orangerie, Terre de Bruyères, Soleil, peu d'eau. de rejetons

Cap de bonne espérance

Aloë humilis thumberg

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, rameuse, un peu couchée, de 0,30 centimètres
Feuilles alternes, à pétiole très court, elliptiques-pointues, souvent penchées
Épi terminal, rameux, roulé en crosse, fleurs attachées du même côté, sans bractées
Corolle à tube double du calice, assez grande, odorante

Bonne serre tempérée, soleil, eau modérée. De Boutures sur couche chaude, Terre de Bruyères du pérou

Heliotropium grandiflorum Schrank

Racine bisannuelle
Tige herbacée, simple, dressée d'1 mètre
Feuilles opposées, fendues en lanières, entières, en fil.
Epi terminal de fleurs bi ou trijugées, penchées
Corolle rouge-écarlate, ponctuée de plus foncé

Orangerie. Terre légère, de graines au printemps, mettre en pleine terre la 2me année de la caroline

Cantua piquetée Ipomopsis elegans michaux

Lith Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, rameuse, dressée, d'1 mètre
Feuilles alternes, à pétiole court, elliptiques-pointues, à lobes un peu dentés, persistantes
Pédoncules axillaires, simples, très longs, formant souvent la cime
demi-fleurons blancs fleurons jaunes

Orangerie, terre franche légère, soleil, eau modérée. De graines sur couche, de boutures. Iles Canaries

Chrysanthème arbrisseau. *Pyrethrum frutescens* willdenow

Lith. Desaillet R des arcis 17

Racine bisannuelle, rameuse
Tige herbacée, droite, rameuse, d'1 mètre
Feuilles alternes, sessiles, en lance, rudes.
Pédoncules plus ou moins rameux, portant plusieurs bractées en feuilles.
Calice d'écailles sèches, dorées. fleurons orangés.

Orangerie. Terre légère, soleil, peu d'eau. De graines aussitôt mures, repiquer en pots. mettre en pleine terre au printemps

Chrysanthe. Elichrysum bracteatum de la Nouvelle hollande ventenat

Lith Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, droite, à nombreux rameaux écartés, longs.
Feuilles opposées, persistantes, de 5 à 7 folioles opposées ovales-pointues, la dernière souvent lobée.
Pédoncules axillaires, divisés en 2 ou 3 pedoncelles à 1 fleur
Calice à lobes en alène, écartés. Corolle blanche en dedans, rouge en dehors, grande

Orangerie, Terre franche légère, Soleil, eau modérée. De greffes en fente sur le Jasmin ordinaire. de l'Inde

Jasmin d'Espagne! Jasminum grandiflorum Linnée

Lith. desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse très rameuse, à rameaux écartés
Feuilles opposées, pétiolées, ovales, dentées, petites
Pédoncules axillaires simples, longs, pendants
Calices longs écarlates, Pétales arrondis, violets

Orangerie, Terre de bruyères, Soleil, beaucoup d'eau. De Boutures

Fuchsia conica Jardin du museum

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, faible, couverte de poils rudes, d'1 à 2 mètres
Feuilles alternes pétiolées en coeur oblong, à doubles dents, à poils courts et raides.
Pédoncules axillaires (portant 2 fleurs env)
Pétales roses, calice velu

Orangerie, Terre ordinaire, mi-soleil eau modérée. De Boutures, de graines. Du Pérou

Malva scabra cavanilles.

Lith. Desaillet R des arcis 17

du Muséum

Tige ligneuse, dressée, très rameuse, d'1 à 2 mètres, à rameaux cannelé
Feuilles opposées en bas, sessiles, en lance, glabres, entières.
Pédoncules courts, verticillés, simples, formant épis terminaux, longs.
Pétales jaunes.

Orangerie, Terre légère, soleil, peu d'eau. De graines et de boutures De Merlus.

heimie Nesæa Salicifolia

lith. Desaillet R. des arcis 17

Racine vivace rameuse
Tige herbacée, dressée, rameuse, d'1 mètre, glabre.
Feuilles opposées, sessiles, ovales-longues, aigues, peu dentées, glabres.
Pédoncules bifides, formant épi terminal
Calice. Corolle glabres, celle ci en cloche rouge dehors, rosée dedans, filet-stérile poilu

Orangerie, terre, flamme légère, soleil, eau modérée, de graines sur couche, d'éclats de Mexico.

Galane en cloche. Chelone campanulata ravanilles

Lith. Desailly [illegible]

Racine conique garnie de radicelles
Tige ligneuse à la base, dressée, un peu poilue, très rameuse, de 60 centimètres
Feuilles alternes, pétiolées elliptiques pointues, dentées, glabres
Fleurs axillaires, solitaires formant épis terminaux
Pétales roses.
Capsule pédoncellée ob-ovale glabre à 4 angles

Orangerie, terre ordinaire, mi-soleil, eau modérée de graines et d'éclats du Pérou

Onagre rose Œnothera rosea aiton

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Racine vivace
Tiges herbacées, simples, dressées, laiteuses, glabres, d'1 mètre 1/2
Feuilles éparses, sessiles, rapprochées, elliptiques, terminées par une pointe
Pédoncules axillaires, simples, longs,
Corolles vermillon carminé, étamines inférieures barbues

Serre tempérée, terre de Bruyères, mi soleil, beaucoup d'eau de boutures et d'éclats

Tupa géante — Tupa gigantea

Lith. Desailles R des arcis 17 — Chez Pelé Rue de l'oursine 71

Tige ligneuse, dressée, rameuse, cylindrique, d'1 mètre
Feuilles alternes, presque sessiles, en lance, très entières
Pédoncules moyens, axillaires, simples, penchés
Pétales grands, d'un rose-violacé

Serre tempérée, terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. De boutures sur couche

Crowée à feuilles de Saule. Crowea Saligna Andrews.

lith. Desaillet-R des Arcis 17

chez Martine Rue des Bourguignons 27

Tige ligneuse, dressée, rameuse, grêle, d'1 mètre, glabre, rougeâtre.
Feuilles éparses, sessiles, ovales-pointues, petites, ouvertes.
Pédoncules courts axillaires, simples, pendants.
Corolles en long entonnoir 4 fois plus longues que le calice, jaunes au bord, carmin sur le tube.

Serre tempérée. Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de boutures sur couche. Nouvelle hollande

Epacride à longues fleurs. Epacris grandiflora Smith

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez les frères Cels chaussée du maine 77

Tige ligneuse dressée rameuse de 30 centimètres, cannelée grenue
Feuilles opposées à pétiole court, ovales-longues, pointues, entières
Verticilles de 6 fleurs, un peu espacés, formant des épis terminaux, bractées courtes
Corolle en long entonnoir violettes, à limbe plus foncé.

Serre tempérée, Terre légère, mi-soleil, eau modérée, de marcottes et de boutures sur Couche

Budleie de lindley — Budleia lindleyana

Chez Pelé Rue de l'oursine 71

Tige ligneuse, dressée, glabre, de 50 centimètres, à rameaux veloutés.
Feuilles ternées, à très court pétiole, en lance, poilues en dessous.
Pédoncules ternés et trifides, formant des cymes terminales.
Corolle au moins triple du calice, vermillon-carminé, à tube un peu poilu

Serre tempérée, terre franche légère, soleil, peu d'eau. De Boutures sur couche. De mexico

Bouvardie à feuilles étroites. Bouvardia angustifolia Humboldt

Lith. Desaillet-R. des arcis 17

Chez les Frères Vels, chaussée du maine 77

Racine rameuse, dure, noirâtre.
Tige ligneuse, rameuse, dressée, très mince, de 60 centimètres, glabre.
Feuilles alternes, linéaires obtuses, presque sessiles, 2 stipules entières très petites.
Pédoncules axillaires, simples, courbés, moins de moitié des feuilles
Etendard fauve nuancé de rouge, carène pourpre foncé.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de boutures

Bossiée à feuilles de lin. Bossiœa linifolia

lith. desailly R des arcis 17

au jardin d'hiver des champs Elisées.

Tige herbacée, peu rameuse, dressée, poilue, rougeâtre, de 30 centimètres
Feuilles opposées, à pétiole moyen, ovales pointues, dentées, vert-noirâtre,
Pédoncules axillaires, simples, solitaires, très longs, poilus.
Corolle rouge en haut, jaune pointillée de rouge en bas.

Serre tempérée, terre franche légère, Soleil, peu d'eau. De graines, d'éclats

Achimène peinte. *Achimenes picta*

Lith. Desvilles r. des arcis 17

Chez Chauvière Rue de la Roquette 104

Tige ligneuse, dressée, carrée, velue, très rameuse d'1 mètre
Feuilles opposées, pétiolées, en cœur long très aigu, velues, pâles en dessous.
Verticilles de 4 à 6 fleurs, écartés, formant des épis terminaux, bractées très courtes.
Calice à 3 dents, peu comprimé, Corolle vermillon-carminé, velue.

Serre tempérée, terre franche légère, soleil, peu d'eau, de graines de boutures — Nouvelle espagne

Sauge-fausse-écarlate. — Salvia-pseudo-coccinea jacquin

Lith. Desaillet R. des arcis 17 — Chez Poté rue de l'ourcine 71

Tige ligneuse, mince, dressée, très rameuse, souple, de 30 centimètres
Feuilles opposées, sessiles, linéaires entières
Fleurs terminales, solitaires très petites
Pétales roses étroits, aigus

Serre tempérée, terre légère, mi-soleil, peu d'eau. de Boutures.

Boronie ployante. Boronia viminea

Lith Desaillet R des arcis 17 Chez les Frères Cels chaussée du maine 77

Tige ligneuse, dressée, rameuse.
Feuilles verticillées par 4, linéaires, longues, ouvertes, (glabres !)
Fleurs terminales, par 4, penchées.
Calices en alène, rouges, Corolle en tube évasé, rouge à bord vert, Etamines sans arête, incluses, style sortant

Terre froide, terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de boutures du cap de bonne espérance

Bruyère resplendissante Erica refulgens. Andrews

Lith. Desaillet 7 des arcis 17 Chez Martine rue des Bourguignons 27

Tige ligneuse, dressée, très rameuse,
Feuilles verticillées par 4, courtes, triquètres, ciliées.
Pédoncules solitaires, axillaires et terminaux, simples, courts.
Calices à sépales larges, poilus, Corolle en cloche, rose, étamines sans arêtes incluses

Serre Froide, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de Boutures

Bruyère choisie Erica dilecta

Lith Desailles R des arcis 17 Chez Lemichez Rue des 3 couronnes 14

Tige arborée, dressée, rameuse, de 2 à 3 mètres
Feuilles éparses, en lance, pointues, coriaces, ponctuées, pétiolées, à 3 nervures
Epis terminaux de fleurs sessiles, rapprochées
Etamines longues, formant un goupillon rouge-vif

Orangerie, Terre de Bruyères, soleil, eau modérée. De graines de boutures sur couche, Nouvelle hollande

Métrosideros en panache. *Metrosideros lophanthus* ventenat

Chez Martine Rue des Bourguignons 27

Racine vivace en griffe d'asperge.
Tige herbacée, dressée, simple, faible, de 40 centimètres
Feuilles éparses, sessiles, en lancé aigues, luisantes, contournées
3 à 4 Fleurs terminales
Pétales ouverts, blanc-rosé, tachés de rouge, les 3 internes à tache jaune pointillée de pourpre.

Serre tempérée, bonne Terre légère, mi-soleil, peu d'eau. De graines, d'éclats — perou, chili

Pélégrine — Alstroemeria pelegrina Linnée

Lith. Desaillot R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, velue d'1 mètre
Feuilles alternes, à long pétiole, en cœur arrondi, anguleuses, blanches cotonneuses en dessous
Panicule terminale de fleurs nombreuses
Calice scarieux, Demi-fleurons et fleurons jaunes

Serre tempérée, Terre de Bruyères. Soleil, peu d'eau. De boutures de marcottes Brésil

Cinéraire à feuilles de tussilage. Cineraria platanifolia Desfont.

Lith. de Zilles 2 des arcis 17

Tige très courte, très grosse, charnue
Feuilles en rosette, ovales, aiguës, épaisses planes en dessus, couvertes de tubercules blancs
hampe de 40 à 50 centimètres, terminée par un épi lâche, à bractées en cœur très aigues
Fleurs petites, verdâtres

Orangerie, Terre de Bruyères, soleil, peu d'eau. d'œilletons (Afrique méridionale)

Aloës perlé aloë margaritifera Linnée

Lith. Desaillot R. des arcis 17



Racine vivace, rameuse
Tiges herbacées, noueuses, peu rameuses, rouges aux articulations
Feuilles alternes, pétiolées, en cœur oblique, anguleuses denticulées, rouge-clair dessous
Panicule terminale, de peu de fleurs
Fleurs rose tendre

Serre froide, Terre de Bruyères, Soleil, beaucoup d'eau, de rejetons, de boutures de la chine

Bégonie à deux couleurs. Begonia discolor Robert Brown

Litho Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, glabre, d'1 mètre 50.
Feuilles alternes, de 11 à 21 folioles opposées, à peine pétiolées, en lance, soyeuses, presqu'étalées
Têtes terminales et latérales, sessiles
Fleurs petites, jaunâtres.

Orangerie; terre légère, soleil, peu d'eau. De graines, de marcottes, de boutures. midi de l'europe, levant, nord de l'afrique.

Anthyllide argentée. Anthyllis barbajovis Linnée.

Litt. Desaillet R. des arcis 17

Tige charnue, dressée, cylindrique, rameuse, de 30 centimètres
Feuilles opposées, sessiles, oblongues, triquètres, charnues, glauques, à carène denticulée
Fleurs terminales, sessiles, solitaires
Pétales linéaires, sur plusieurs rangs, nombreux, rosés

Serre tempérée, terre de Bruyères, soleil, peu d'eau. De Boutures ressuyées, sur couche. Cap de b. Espér.

Ficoïde Denticulée. Mesembryanthemum denticulatum
haworth.

Lith. Descaillet R. Des arcis 17.

Tige ligneuse, dressée, rameuse, de 3 à 4 mètres
Feuilles alternes de 12 à 18 pinnules à 26-38 folioles ovales allongées, petites, à pointe
Epis axillaires, pédonculés, deux à deux, longs, légers.
Fleurs jaunes

Serre tempérée, terre franche légère, mi-soleil, eau modérée. de graines et de boutures sur couche Nelle Hollande

Acacia à deux epis — acacia lophantha willdenow

Lith. Desailler R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 mètre 30.
Feuilles alternes, de 12 à 16 folioles opposées, ovales, à pointe, persistantes, cotonneuses en dessous.
Panicules terminales, ramassées
Calices obtus, Pétales jaunes, étamines inégales.
Légumes comprimés velus, graines comprimées, sans pulpe.
Orangerie, terre franche légère, soleil, beaucoup d'eau. De graines et de boutures sur couche Amérique meridionale

Casse cotonneuse, Cassia tomentosa Linnée

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse à la base, grêle, dressée, peu rameuse. De 60 centimètres
Feuilles en rosette en spatule, glauques en dessus, rougeâtres dessous, entières, épaisses
Épi terminal lâche
Pétales violacés

Serre tempérée, Terre légère, Soleil, peu d'eau. De graines et de boutures — Du Chili

Calandrine à grandes fleurs. Calandrinia grandiflora Lindley

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tiges plates, articulées, charnues, vertes, rameuses de 20 à 50 centimètres, crénelées
Feuilles nulles
Fleurs sessiles, solitaires dans les crénelures, longues de 12 à 15 centimètres
Pétales écarlates

Orangerie, Terre de Bruyères, Soleil, peu d'eau. de boutures

Epiphylle d'Ackermann. Cactus ackermanni

Lith. Desailles-R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, glabre, de 1 à 2 mètres, à rameaux nombreux, écartés
Feuilles alternes pétiolées, en cœur, à 3 lobes pointus, dentés, lisses
Pédoncules axillaires, solitaires, simples, très longs,
Fleurs en cloche pendante, jaunes, à nervures pourpres, calice glabre.

Orangerie, Terre légère, Soleil, eau modérée. De boutures

Abutilon Strié — Abutilon Striatum Dickson

lith Desaillot R des arcis 17



Racine trisannuelle
Tige herbacée, dressée, très rameuse de 60 centimètres, cylindrique, glabre.
Feuilles alternes embrassantes, glabres, à lobes arrondis, souvent dentés.
Panicule terminale lâche en corymbe
Calicule ouvert. demi fleurons violets, fleurons jaunes.

Orangerie Terre légère riche, de graines sur couche, repiqué en motte au Soleil. Afrique australe

Séneçon des indes. Senecio élegans Linnée

Lith. Degaillet R. des arcis 17

Racine vivace
Tige ligneuse à la base, dressée, rameuse, d'1 mètre, velue
Feuilles opposées, sessiles, en lance, denticulées, poilues.
Paniculé terminale
Calyce glanduleux, Corolle en mufle, à tube violacé, et limbe jaunâtre

Orangerie, Terre légère, mi-soleil, peu d'eau. De graines et d'éclats, Amérique boréale
Pentstemon velu Pentastemon hirsuta willdenow.

Lith. Desaillot R. des amis 17

Ognon d'enveloppes concentriques
Tige nulle
Feuilles sortant de l'ognon à 3 grandes folioles en cœur à peine poilues
hampes dressées, de 20 centimètres terminées par une ombellule de pédoncules souvent fourchus
Pétales très grands, rose foncé, stigmates plus courts que les petites étamines.

Serre froide, Terre de Bruyères, mi-soleil, peu d'eau. de cayeux

Oxalide de bowe Oxalis boweana

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez Pelé rue de Touraine 71

Racine vivace
Tige dressée rameuse de 5 centimètres, rougeâtre
Feuilles opposées, en Spatule, dentées
Pédoncules axillaires et terminaux simples, très longs
Calice bosselé, Pétales violacés, à gorge brune

Serre tempérée, Terre franche, mi-Soleil, eau modérée, de graines.

Viscaire ocellée Viscaria oculata.

Lith. Desaillet R des ursins 17

Chez Chauvière rue de la roquette 104

Tiges très courtes ligneuses
Feuilles en rosette, sessiles, obovales, pointues, denticulées, à peine pubescentes
hampe centrale de 10 à 12 centimètres terminée par une ombellule de 6 à 10 fleurs
Calice velu, corolle violacée, à lèvre supérieure plus foncée, velue.

Bonne serre tempérée. Terre de bruyères, Soleil, eaux modérées. Eclats

Tetranème du mexique, Tetranema mexicana

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Chez les frères Cels chaussée du maine 77

Racine rameuse, fibreuse
Tige ligneuse à la base, très rameuse sarmenteuse, de 2 mètres
Feuilles alternes, à long pétiole, en cœur, pointues, à grandes dents.
Pédoncules axillaires, solitaires, longs, s'enroulant autour des tuteurs
Corolle grande, rose foncé, tachée de blanc.

Serre tempérée, Terre substantielle, soleil, beaucoup d'eau pendant la végétation. de graines de boutures

Lophosperme d'anderson Lophospermum andersonii

Lith. Desaillet R des arcis 17 Chez Pelé Rue de Lourcine 71

Tige ligneuse, dressée, rameuse, glabre, d'1 mètre à 1m 30c
Feuilles opposées, à pétiole court, en lance étroite, pointues, dentées, glabres.
Verticilles rapprochés en épis terminaux et axillaires, bractées très petites.
Calice à 3 dents, presque cylindrique, Corolle bleue.

Serre tempérée, Terre légère, Soleil, peu d'eau. de graines, d'éclats, de boutures. midi de la Caroline

Sauge azurée

Salvia azurea Lamarck

Lith. de Saillet R. des arcis 17

Chez Martine Rue des Bourguignons 27

Racine vivace rameuse
Tiges herbacées, peu-rameuses, dressées, de 25 à 30 centimètres
Feuilles opposées, pétiolées, ovales, dentées, poilues, rougeâtres en dessous,
Pédoncules axillaires, solitaires, longs
Corolle presque régulière rouge, avec une tâche jaune pointillée de brun.

Serre tempérée, Terre franche légère, Soleil, eau modérée. de graines et d'éclats

Achimenes rose Achimenes rosea.

Lith. Desaillot R des arcis 17

Chez Chauvière Rue de la Roquette 104

Tige ligneuse, dressée, rameuse, de 60 centimètres
Feuilles 4 par 4, rapprochées, linéaires, velues.
Fleurs terminant les petits rameaux, rassemblées par 2, 3, 4.
Corolle en tube évasé, rosés, Etamines sans arêtes, incluses, Calice large, mucroné

Serre froide, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de marottes et de boutures

Bruyère d'hiver. *Erica hiemalis*

Lith. Desaillet R. Ds arcis 17

Chez Vaillant Boulevard Ds Italiens 25.

Tige ligneuse dressée rameuse velue
Feuilles 4 par 4, linéaires, obtuses, ouvertes, laineuses.
Fleurs terminant les petits rameaux, solitaires, penchées
Corolle en tube évasé, velue, rouge sale, étamines sans arêtes, excluses.

Serre froide, terre de bruyères, mi soleil, eau modérée. de boutures de marcottes du cap de B. Esp.

Bruyère sordide. Erica sordida Andrews.

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez martine Rue des bourguignons 27

Tige ligneuse à la base, dressée, rameuse, à peine poilue
Feuilles opposées, sessiles, linéaires, pointues, glabres
Pédoncules axillaires, solitaires, simples, longs
Fleurs violettes

Serre tempérée, Terre franche légère, mi-soleil, eau modérée. de graines, de boutures

Chilodie en Scutellaire . Chilodia Scutellarioïdes

Lith. Desaillet 72 des arcis 17.

Chez les frères Cels chaussée du maine 77

Racine vivace
Tige herbacée, rampante, très rameuse, glabre, de 2 mètres
Feuilles alternes en bouclier, en cœur, à 5 ou 7 lobes arrondis, glauques.
Pédoncules axillaires, solitaires longs
Éperon crochu égal aux grands pétales qui sont frangés, jaunes

Orangerie. bonne terre légère, soleil, beaucoup d'eau, de graines, d'éclats. du pérou

Capucine crochue Tropæolum aduncum Smith

Lith. desaillet R des arcis 17 Chez Pelé Rue de Loursine 71



Tige ligneuse à la base, à rameaux herbacés, anguleuse, d'1 mètre.
Feuilles décussées, sessiles, en cœur allongé, pointues, raides, et rudes
Epis terminaux rameux, bractées presqu'égales aux calices, fleurs sessiles.
Corolles très petites violettes

Orangerie, terre legère ; Soleil, eau modérée. De graines de boutures

Verveine ailée Verbena alata Jardin du Muséum.

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, glabre, d'1 mètre
Feuilles 3 par 3, pétiolées, en cœur, dentées, glabres.
Épis terminaux pendants.
Calices très longs cylindriques, rouges, pétales arrondis, rouge foncé.

Serre tempérée, Terre de bruyères, soleil, beaucoup d'eau. de graines de boutures

Fuchsie brillante. Fuchsia fulgens

Lith. [illegible] mois 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 mètre
Feuilles opposées, pétiolées, de 3 folioles, ovales-longues, pointues, odorantes.
Panicules axillaires, dressées, petites
Fleurs petites, blanches, nuancées de rose, tout l'été

Orangerie, Terre de bruyères, mi-soleil, eau modérée. de graines de marcottes. Nelle hollande

Zierie à trois feuilles Zieria trifoliata.

lith desaillet R des arcis 17

Racine bisannuelle
Tige ligneuse, très rameuse, couchée ou grimpante, couverte de poils piquants
Feuilles opposées, pétiolées, en cœur pointu pinnatifides et denticulées
Pédoncules axillaires, solitaires, longs
Pétales en capuchon écarlates, écailles à 3 dents

Serre tempérée, bonne terre légère, soleil, beaucoup d'eau l'été. De graines

Loase orangée Loasa aurantiaca.

Lith. [illegible]

Tige ligneuse rameuse un peu diffuse d'1 mètre, velue
Feuilles alternes, pétiolées, persistantes, ovales ou en lance, rugueuses
Epis terminaux rameux d'abord en crosse, sans bractées
Corolle petite violacée, à tube égalant le calice, à odeur de vanille

Orangerie, Terre franche légère, Soleil, beaucoup d'eau, de graines, de boutures sur couche du pérou

Héliotrope du pérou — Heliotropium peruvianum

Linnée

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, très rameuse, à rameaux écartés, d'1 mètre
Feuilles alternes, les inférieures incisées-dentées, les supérieures en lance entières
Pédoncules longs, solitaires au bout de la tige et des rameaux
Fleurs de 6 centimètres de large, ½ fleurons cramoisis bordés de jaune, fleurons bruns

Serre tempérée, terre franche légère, mi-soleil, eau modérée. de graines, d'éclats, de boutures

Gaillarde peinte Galardia picta hortus paris.

Lith. Desailly — R. des Arcis 17

Racine vivace
Tige herbacée, dressée, rameuse, velue, visqueuse
Feuilles opposées, de 5 à 13 folioles dentées ou pinnatifides, velues-visqueuses.
Pédoncules terminaux, solitaires ou par 2 ou 3
Corolles petites à lèvre supérieure très petite

Serre tempérée, terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de graines du pérou du chili

Calceolaire pinnée Calceolaria pinnata Lamarck

Lith. Desaillet R. des arcis 17

jardin du Muséum

Tiges charnues dressées vivaces rameuses à la base, d'1 mètre
Feuilles opposées, sessiles, soudées à la base ovales-allongées, cartilagineuses, ciliées
Epi terminal, court
Pétales soudés en tube écarlates

Serre tempérée, terre de bruyères, Soleil peu d'eau. De boutures Du cap de B. Espér.

Crassule écarlate Crassula coccinea Linnée

Lith. Desailly-R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, à rameaux étalés, ascendants, haute de 20 à 30 centimètres
Feuilles opposées, connées, bisquètres, allongées, aigues, glauques, à glandes saillantes
Pédoncules terminaux, solitaires, simples
Fleurs grandes, pétales pourpres.

Serre tempérée, terre de bruyères, soleil, peu d'eau — De Boutures — Du cap de bonne espérance

Ficoïde merveilleuse, Mesembrianthemum Spectabile Haworth

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tiges nombreuses, ligneuses à la base peu rameuses, de 80 centimètres, a aiguillons crochus.
Feuilles de 3 à 7 folioles ovales, velues en dessous, aigues, à doubles dents.
Pédoncules solitaires, terminant des ramuscules axillaires
Fleurs larges de 4 à 5 centimètres, pétales blancs, très nombreux dans la variété double
Fruits mangeables.

Orangerie, terre à oranger, mi-soleil, eau modérée, de boutures et d'éclats. Iles mascarrignes

Ronce à feuilles de rosier. Rubus rosæfolius Smith

Lith. desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, glabre de 4 à 5 mètres
Feuilles (pétiolés foliacés) en lance étroite, amincis aux 2 bouts, à 1 nervure, glanduleux au sommet
Epis axillaires souvent binés, longs.
Fleurs espacées, jaunes, étamines longues, cachant les pétales.

Serre tempérée, terre de bruyères mêlée de t. franche. mi soleil, eau modérée. de graines et de marcottes.

Mimose à longues feuilles. Acacia longifolia

Nouvelle Hollande Willdenow.

Lith Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, faible, grimpante, rameuse, de 2 à 3 mètres.
Feuilles alternes, pétiolées, ovales-allongées, obtuses, mucronées
Épis de fleurs souvent binées ou ternées, pédonculées.
Corolle petite, d'un beau bleu violacé, étendard marqué de 2 taches vertes

Serre tempérée, Terre légère, Soleil, eau modérée. De graines et de boutures nouvelle Hollande

Kennedie à une foliole *Kennedia monophylla* Ventenat.

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, d'1 à 2 mètres, rameaux souvent verticillés
Feuilles alternes, quelquefois comme verticillées, en lance, ondulées, persistantes.
Panicules terminales à pédoncules collants
Calices visqueux, Pétales blancs, odeur de jasmin.

Orangerie, terre franche légère, mi-soleil, eau modérée, de graines et de marcottes par incision, sur couche.

Pittospore ondulé   Pittosporum undulatum Andrews
nouvelle hollande

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, d'1 à 2 mètres, à rameaux épineux
Feuilles alternes, obovales, obtuses, persistantes, coriaces, entières.
Panicules lâches, axillaires.
Pétales blanc-terne.

Orangerie, Terre légère melée de bruyère, mi-soleil, eau modérée. de graines de marcottes. du cap de B. esp.
Célastre à feuilles entières, Celastrus integrifolius Thunberg
Litt. des ailles R des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, très rameuse, de 2 mètres, rameaux un peu velus au sommet.
Feuilles alternes, peu pétiolées, ovales-longues, dentées dans leur moitié supérieure.
Chatons axillaires, sessiles, courts à écailles aigues, disïques
Fleurs jaune-verdâtre.
Baies globuleuses petites, couvertes d'une poudre blanche
Orangerie, terre légère, soleil, beaucoup d'eau. de graines de marcottes sur couche. Amérique Septent.

Cirier *Myrica cerifera* *linnée*

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 mètre, glabre.
Feuilles opposées, à pétiole court, ovales étroites, pointues.
Fleurs sessiles, axillaires, opposées en épis terminaux, simples
Corolle grande, non comprimée, violacée, 3 étamines avortées

Serre tempérée, Terre légère. Soleil, beaucoup d'eau. De graines et de boutures sur pousse.

Carmantine de philadelphie. Justicia philadelphica.

lith desaillet R des arcis 17 chez Pelé R de Toursine 71

Tige ligneuse, dressée, rameuse, velue, de 20 à 30 centimètres
Feuilles opposées ou ternées sessiles ovales pointues ou obtuses, velues.
Pédoncules axillaires solitaires, simples, très longs, en fil
Pétales rose foncé, anthères brunes.

Serre froide, Terre tourbeuse et sableuse, [illegible] soleil. beaucoup d'eau. de boutures
Trémandre d'hugel Tremandra hugelii.

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez les frères Cels chaussée du maine 77

Tige ligneuse, dressée, d'1 mètre, à rameaux verticillés
Feuilles verticillées par 4 à pétiole très court, en lance, poilues dessus, roulées, argentées dessous.
Épis terminaux très serrés, de fleurs verticillées, à bractées très longues, pointues.
Calice argenté à dents égales au tube, Corolle blanche pointillée de rouge et de jaune.

Orangerie, terre de bruyères, mi-soleil, eau modérée, de graines et de boutures sur couche tiède.

Westringie à grandes fleurs. Westringia grandiflora

Lith. desaillet R des arcis 17 — Chez [illegible] 104

Tiges ligneuse, dressée, cylindrique, d'1 mètre, à rameaux velus.
Feuilles alternes, un peu pileolées, elliptiques-longues, glabres, persistantes.
Epis terminaux, très courts, à pédoncules longs et bractées très courtes.
Calice à grandes divisions (ailes) violacés, Pétale inférieur (carène) à aigrette, anthères nues.

Serre tempérée, Terre franche légère, mi-soleil, eau modérée, de graines, de marcottes de boutures sur couche chaude

Polygala à larges feuilles. Polygala latifolia

Chez Martine rue des bourguignons 27

Tige ligneuse, dressée, rameuse, glabre, de 50 centimètres
Feuilles opposées, sessiles, en lance très aigue, glabres, pâles en dessous.
Panicule terminale
Corolle blanche, lèvre inférieure striée de rouge, staminule glabre.

Orangerie, Terre légère, mi-soleil, eau modérée. De graines, de boutures.

Pentstemon de Mac-ewverne. Pentastemon mac-ewvernii

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Chez thibaut Rue St Maur 47

Tiges ligneuses à la base, d'1 mètre 50. à rameaux verticillés, glauques
Feuilles verticillées par 3 ou 4, sessiles, en lance aigue, glauques, ouvertes, à 1 ou 3 nervures
Epis terminaux, à bractées aigues, courtes, pédoncelles assez longs.
Fleurs grosses, calice aigu, corolle violette, palais taché de jaune.

Orangerie, terre ordinaire, toute exposition. De graines, d'éclats, de boutures. Amérique moyenne, midi de l'espagne

Linaire à trois fleurs. Linaria triornithophora Linnée

Lith. Desailler R. des arcis 17 Chez Pelé Rue de Loursine 71

Tige ligneuse à la base, dressée, rameuse, glabre, d'1 mètre
Feuilles opposées, sessiles, en lance, glabres, entières,
Epis axillaires longs, de fleurs pédoncellées, bi-trigéminées
Corolle blanche

Serre tempérée, Terre franche légère, mi-soleil, eau modérée. De graines De boutures. Nouvelle Zélande.

Véronique à feuilles de Sauge *Veronica Salicifolia* Forster

lith. Desailles R. des arcis 17

Chez les frères Pels chaussée du maine 77

Tige ligneuse, dressée, rameuse, glabre, de 50 centimètres
Feuilles opposées, pétiolées, ovales-étroites, pointues, entières, à peine ciliées
Fleurs pédonculées entre les feuilles, formant comme des épis terminaux.
Pétales sup^rs violets, les 4 inf^rs roses. calice à éperon très court, obtus

Serre tempérée, Terre franche légère, mi-soleil, eau modérée, de graines et de boutures

Cuphée fleurissante Cuphea floribunda.

Lith. Desuillet R. des arcis 17 Chez Bertrand Rue de la roquette 102



Tige dressée, très rameuse, de 50 centimètres, rameaux très touffus
Feuilles ternées, très étroites, raides, très rapprochées.
Fleurs terminant des ramuscules, solitaires ou en faisceaux, pendantes
Calice rougeâtre, Corolle rouge, tubuleuse, Etamines très exclues, anthères nues.

Serre froide, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, De marcottes et de boutures. du Cap de B. Esp.

Bruyère Sebane *Erica Sebana* Linn

Chez Vaillant Boulevard des Italiens 25

Tige ligneuse, dressée, rameuse, ciliée, de 30 centimètres
Feuilles quaternées, longues, ciliées, espacées.
Fleurs terminales et quelquefois axillaires, pétiolées, solitaires, bi, tri, ou quadrijugées.
Calice court, corolle en grelot rose, Anthères incluses à appendices.

Serre froide, Terre de Bruyères mi-soleil, eau modérée. De marcottes et de Boutures

Bruyère ovale Erica ovata

Lith. Desaillet R. des arcis 17 au jardin d'hiver des champs élisés.

Tige herbacée, dressée, rameuse, velue, feuillée, de 30 centimètres.
Feuilles alternes, très peu pétiolées à 3 folioles en spatule échancrée, velues.
Pédoncules très longs, axillaires, solitaires, simples.
Corolle en cloche. Styles dépassant les petites étamines.

Serre froide, terre de Bruyères, mi-ombre, peu d'eau.. de rejetons

Oxalide velue — Oxalis hirta Linnée

Lith. Desaillet R. des arcis 17 — Chez Pelé Rue de Loursine. 71

Racine rameuse
Tige ligneuse dressée, rameuse, carrée, d'1 mètre
Feuilles opposées, pétiolées, ovales en cœur, dentées
Verticilles de 4 à 6 fleurs pé[illegible]culées, formant des épis terminaux
Calice à 3 dents, peu comprimé, velu, Corolle plus du double de sa longueur, pourpre

Serre tempérée, Terre légère, soleil, peu d'eau. de graines, de rejetons, de boutures.

Sauge de graham. Salvia grahami.

Lith. Desailler R. des arcis 17 Chez Pelé Rue de Lourcine 71

Tige ligneuse, dressée, rameuse, couverte de duvet écailleux, d'1 mètre 30 cent.
Feuilles opposées, pétiolées, obovales, cotonneuses en dessous, persistantes.
Fleurs solitaires ou en tête au bout de rameaux axillaires
Calice à dents aigues. Pétales distincts, blanc pur

Orangerie, Terre de bruyères, mi-soleil, eau modérée. De graines, de marcottes, de boutures. N^elle Hollande

Correée à fleurs blanches. *Correa alba* Andrews.

Lith. Desailly R. des amis 17

Tiges herbacées, rampantes, simples, rougeâtres, glabres, de 20 à 30 centimètres
Feuilles opposées ou ternées, presque sessiles, en ellipse transverse, charnues, ondulées.
Panicule terminale, très touffue, formant la cyme
Fleurs petites, pétales roses.

Orangerie, Terre de Bruyères, Soleil, eau modérée. d'éclats.

Sédum de Siéboldt — Sedum Sieboldtii

Lith. Desailles R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 mètre, rameaux glauques.
Feuilles alternes, à pétiole court simples ou à 3 folioles, ovales
Têtes ou épis axillaires de 3 à 6 fleurs
Calice très velu, corolle jaune

Orangerie, Terre légère, Soleil peu d'eau. de graines de marcottes de boutures. Europe méridionale, Syrie.

Anthyllide à feuilles de Cytise. Anthyllis cytisoïdes Linnée

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, mince très glabre, de 60 à 80 centimètres
Feuilles opposées de 5 à 9 folioles très étroites, aigues, glabres.
Pédoncules axillaires, solitaires, bifides.
Fleurs moyennes, pétales roses, odeur d'aubépine.

Orangerie, Terre de bruyères, mi-soleil, peu d'eau. de boutures — Nelle Galles

Boronie à feuilles ailées. Boronia pinnata Smith

Lith. Desailles R. des arcis 17

Racine rameuse, vivace.
Tige herbacée, dressée, glabre, articulée, d'1 mètre
Feuilles opposées, sessiles, connées, ovales-aigues,
Pédoncules terminaux 3 à 3, très courts
Calice en massue à 10 côtes, pétales larges, déchiquetés, vermillons.

Orangerie, Terre de bruyères, mi-soleil, peu d'eau. De graines, de marcottes, de boutures. Chine et Japon.

Lychnide à grandes fleurs — Lychnis grandiflora jacquin

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse
Feuilles rapprochées, sessiles, ovales-longues, aigues, velues en dessous.
Pédoncules en ombellules terminales, courts
Calices poilus, Pétales blancs, Disque perigyne surmonté de 5 staminules glanduleuses

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau moderée, De graines de marcottes de boutures. Cap de bonne espérance

Diosma velue. Diosma villosa Thunberg

Lith. Desailly R. des arcis 17

Tige peu rameuse, ligneuse, brune, de 20 à 30 centimètres
Feuilles alternes, embrassantes ou découvrentes, lobées, déchiquetées, cotonneuses.
Epis terminaux courts, compacts, rarement rameux.
Calice cotonneux, Pétales roses, tachés de plus foncé.

Serre tempérée, Terre ordinaire, mi-soleil, eau modérée. de graines et de boutures du Chili.

Francoa à feuilles de laitron. Francoa sonchifolia willdenow

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, faible, rougeâtre, à rameaux charnus, glabres, pendants.
Feuilles opposées, en alène, ½ cylindriques, persistantes, charnues, glabres
Pédoncules terminaux solitaires, simples, longs
Pétales violets

Serre tempérée, terre de bruyères, soleil, peu d'eau. De boutures à l'ombre d'Afrique méridionale.

Ficoïde violette Mesembryanthemum violaceum Decandolle.

Lith. desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, rougeâtre, de 60 centimètres
Feuilles opposées et ternées, à court pétiole, ovales, dentées, glabres.
Pédoncules axillaires, simples, longs, pendants.
Calice globuleux rouge vif, Pétales violets, Etamines très saillantes.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, Soleil, beaucoup d'eau, de graines et de boutures

Fuchsie en globe. *Fuchsia globosa.*

Lith. Desaillet R. 25 avril 17

Tige ligneuse dressée, grêle, souple, d'1 mètre 50, à rameaux nombreux, blanchâtres
Feuilles éparses, linéaires, en gouttière, courbées, pointillées de blanc, persistantes.
Épis serrés cylindriques, formant le goupillon au milieu des rameaux
Fleurs petites, rose-pourpre, anthères dorées.

Orangerie, Terre de Bruyères, Soleil, beaucoup d'eau. De boutures sur couche. Nouvelle Hollande

Melaleuque armillaire . *Melaleuca armillaris* Smith.

Racines minces, camifiées, écartées
Feuilles ramassées en rosettes, charnues, ovales, réunies par des fils formant une toile d'araignée
Tige centrale herbacée, dressée, simple, de 20 centimètres, velue à feuilles éparses
Panicule terminale à fleurs sessiles sur ses rameaux.
9 Pétales pourpres.

Orangerie, Terre de Pouyères, soleil, peu d'eau, de rejetons — Europe méridionale

Joubarbe fil d'araignée. Sedum arachnoideum miller

Lits d'oreiller et des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, tortueuse, de 3 à 4 mètres.
Feuilles alternes de 25 à 51 folioles elliptiques-longues, glabres.
Grappes de fleurs pendantes, à longs pedoncelles.
Fleurs grandes, beau jaune.

Orangerie, terre ordinaire, mi-soleil, eau modérée. ⁂ graines sur couche, de marcottes incisées. ♄ Nlle Zélande

Edwardsier à grandes fleurs. *Edwardsia grandiflora* Salisbury

Lith. de Saillet r. des amis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, de 50 centimètres, à rameaux grêles, épineux
Feuilles alternes, presque sessiles, ovales, sinuées-dentées, épineuses, coriaces.
Grappes axillaires et terminales
Fleurs petites, etendard jaune, lavé de vermillon vif

serre froide, Terre de Bruyères, mi-soleil, peu d'eau, de graines et de marcottes sur couche. Mlle hollande

Chorizème à feuilles de houx. Chorizema ilicifolium. Labillardière

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, d'1 mètre, à rameaux tétragones, pubescents
Feuilles opposées, à pétiole très court, elliptiques, pointues, entières, poilues.
Pédoncules terminaux allongés, bifides, à bractées étroites aigues.
Calice glabre. Corolle écarlate.

Serre tempérée, Terre de bruyères, Soleil, beaucoup d'eau. de boutures sur couche. Amérique du sud.

Ruellie à feuilles grandes. *Ruellia macrophylla* wahlenberg

Lith. Desaillot R. des arcis 17

Chez Bertrand rue de la roquette 102

Tige ligneuse à la base, dressée rameuse, visqueuse, de 60 à 80 centimètres.
Feuilles opposées, sessiles, en lance, petites, entières
Grappes terminales.
Calice à dents aigues, Pétales déchiquetés, roses.

Serre tempérée, Terre franche légère, mi-soleil, eau modérée, d'éclats, de boutures, de graines.

Lycnide de fortune Lychnis fortunei.

Litt. desaillet R des arcis 17 Chez Pelé rue de Loursine 71

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 à 2 mètres
Feuilles opposées, à court pétiole, elliptiques, échancrées en cœur au sommet.
Grappes terminales très denses
Calice à divisions aiguës, Corolle violet foncé.

Serre tempérée, Terre légère. mi-Soleil, eau modérée. De boutures.

Véronique remarquable. Veronica Speciosa.

Lith. Delaillet R des arcis 17 Chez Lemichez rue des 3 couronnes 14

Tige ligneuse, dressée, rameuse d'1 mètre, glabre.
Feuilles éparses, sessiles, en lance, très aigues, très ouvertes.
Pédoncules axillaires, très courts, pendants, solitaires, simples.
Calice à divisions aigues, bien plus court que la corolle qui est écarlate vif.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de boutures. Nelle hollande

Epacride empreinte Epacris impressa Labillardière

Lith. Desailly rue des arcis 17 Chez Thibaut rue St Maur 45

Tige ligneuse à la base, dressée, à rameaux herbacés, nombreux, collants.
Feuilles alternes, embrassantes, obovales, denticulées au sommet.
Fleurs terminales, solitaires, des bractées en lance à la base du calice.
Demifleurons jaunes, fleurons verdâtres.

Serre tempérée, Terre mélangée, Soleil, eau moderée. de boutures

Grindélie visqueuse. Grindelia viscosa.

Lith. Desvillet R. des arcis 17 Chez Chauvière Rue de la roquette 104

Racine vivace
Tige herbacée, rampante, rameuse, glabre, de 30 centimètres
Feuilles alternes, sessiles, les inférieures obovales, les supérieures en lance.
Grappes ou panicules terminales.
Calice à divisions aigues, Corolle blanche.

Serre tempérée, Terre ordinaire, Soleil, peu d'eau. de graines et de boutures N.lles Zelande, N.lle Hollande

Sheffieldie rampante. Sheffieldia repens Forster.

Chez Pelé Rue de Lourcine 71

Tige dressée, ligneuse, d'1 à 2 mètres, à rameaux étagés.
Feuilles verticillées par 6, étroites, un peu velues, rapprochées.
Fleurs ramassées par 4, 5, 6, 8, au bout des rameaux
Calice velu, Corolle en tube évasé, blanche, ou rouge-violacé, étamines incluses sans arêtes.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi soleil, eau moderée, de Boutures. Du Cap de B. Espér.

Bruyère mignonne Erica concinna. aiton.

Lith Desaillet R des arcis 17

Chez Martine rue des Bourguignons 27

Tige ligneuse, dressée, menue, tortueuse, très rameuse
Feuilles verticillées par 4, très étroites, ouvertes, ciliées,
Fleurs solitaires, terminales, penchées
Calice glabre, Corolle en cloche, rose, Anthères incluses sans arêtes,

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de Marcottes et de boutures.

Bruyère en clochette. Erica campanularis

Lith. Desaillet R. des amis 17 — Chez Lemichez, rue des 3 couronnes 14

Tige ligneuse de 4 à 20 mètres, Dressée, rameuse
Feuilles éparses, un peu pétiolées, Stipulaires pointues, dentées, persistantes.
Pédoncules axillaires, simples, longs, courbés
Calice cotonneux, Pétales. blancs, velus.

Serre tempérée, Terre franche légère. Soleil, eau modérée. De graines et de marcottes. De Caroline.

Gordone à feuilles glabres. Gordonia lasianthus Linnée

Lith. Desaillot Rue des arcis 17

Chez Lemichez Rue des 3 couronnes 14

Racine vivace, rameuse.
Tige presque nulle, les feuilles paraissent toutes radicales.
Feuilles en spatule, glabres, à 3 grosses nervures.
hampe centrale, nue, de 20 à 30 centimètres, terminée par une tête de 10 à 20 fleurs.
Calice glabre, rosé, Pétales obovales, rose foncé.

Serre tempérée, Terre franche légere, Soleil, eau modérée. De graines et d'éclats.

Armérie géante Armeria gigantea

Lith. Desailles R. des arcis 17 Chez Pelé rue de loursine 71.

Tige ligneuse, dressée, rameuse, glabre.
Feuilles alternes, pétiolées, ovales-triangulaires, coriaces, crenelées, épineuses.
Ombellules terminales d'involucres à 4 folioles blanches-rosées, contenant 4 à 8 fleurs
Calice à 5 dents, 5 pétales courbés, blancs.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, Soleil, beaucoup d'eau. De Boutures

Xanthosie à feuilles rondes. Xanthosia rotundifolia.

Lith. Desguillet R. des arcis 17

Chez Chauvière rue de la roquette 104

Tige ligneuse, dressée, rameuse, de 60 centimètres
Feuilles opposées et alternes en lance, entières, glabres, pâles en dessous.
Panicules terminales, très serrées de fleurs nombreuses et petites
Corolles blanches. Aigrette de 5 arêtes

Orangerie, terre franche, soleil, eau modérée de graines, d'éclats, de boutures.

Stévia de Lindley. Stevia lindleyana

Lith. Desaillot R. des amis 17

Chez Chauvière Rue de la roquette 104

Racine vivace, en cône renversé, brune.
Tige si courte que les feuilles paraissent radicales.
Feuilles à 5 palmures incisées-dentées, pointues, glabres.
hampe dressée de 20 à 30 centimètres, terminée par une ou plusieurs ombellules.
Calice à divisions terminées par une pointe (mucronées) Pétales égaux rose-violacé.

Orangerie, Terre ordinaire, mi-soleil, eau modérée, de graines. Iles canaries

Géranium à feuilles d'anémone. Geranium anemonæfolium L'héritier

Lith. de Saillet R. des arcis 17

Oignon petit, allongé, brun
Tige dressée, herbacée, nue en bas, de 5 à 6 centimètres, ramifiée en haut
Feuilles en touffes, pétiolées, à 3 folioles en coin étroit, glabres, à 2 taches au bout
Pédoncules simples, terminaux, en paquets, plus longs que les feuilles.
Corolle blanche bordée de rouge, Styles dépassant les étamines.

Serre froide, soleil, peu d'eau, Terre de Bruyères, de cayeux. Cap de Bonne espérance.

Oxalide à deux couleurs. Oxalis versicolor Linnée

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, velue d'1 à 2 mètres
Feuilles alternes, pétiolées, en cœur, à 5 angles, à grosses dents, rudes.
Panicules terminales
Calice extérieur caduc. Pétales en cœur cramoisis.

Bonne Serre tempérée. Terre franche légère, soleil, eau modérée, de graines de boutures. de mexico.

Mauve à ombelles Malva umbellata cavanilles

Lith Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, couchée, rameuse, souvent coudée, poilue.
Feuilles alternes sessiles, en lance, pinnatifides, velues. Stipules ciliées.
Pédoncules axillaires simples, formant comme des grappes terminales
Calice poilu, Pétales rougeâtres.

Serre tempérée, Terre à orangers, mi-soleil, eau modérée, de graines de boutures. Cap de B. Espérance

Mahernie incisée. Mahernia incisa Sacquin.

Lith Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, un peu couchée, très rameuse
Feuilles opposées, sessiles, obovales, glabres, à 3 nervures, blanchâtres.
Panicule à longs pédoncules verruqueux.
Pétales jaunes tachés de pourpre à la base, Style droit et court.

Orangerie, Terre franche légère, Soleil, peu d'eau. de graines, de marottes, de boutures. Espagne,

helianthème à feuilles d'halime. helianthemum halimifolium des fontaines

Lith. de Saillet & des arcis 17

Tiges ligneuses, dressées, rameuses, brunes, de 20 à 30 centimètres
Feuilles opposées, pétiolées, ovales, dentées, très petites.
Pédoncules axillaires, solitaires, simples, pendants.
Fleurs petites, courtes. calices pourpre, Pétales arrondis, pourpre foncé.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, soleil, beaucoup d'eau. de graines, d'éclats, de boutures.

Fuchsie à feuilles petites. Fuchsia microphylla

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige charnue, vivace, penchée, rameuse, de 40 à 50 centimètres.
Feuilles alternes, sessiles, épaisses, en spatule, visqueuses, ciliées
Panicule grande et lâche, à pédoncules écartés, collants, à fleurs nombreuses.
Calice glabre, Pétales jaunes.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, soleil, peu d'eau. De graines de boutures *D. Madère*

Joubarbe glutineuse *Sempervivum glutinosum* Aiton

Lith. Desaillet-R. des arcis 17

Tige ligneuse, penchée, très rameuse, rougeâtre, de 20 à 25 centimètres
Feuilles opposées, sessiles, très charnues, glauques, en triangle à bords dentés, et dos entier.
Panicules terminales, à fleurs nombreuses.
Pétales étroits, violets

Serre tempérée, terre de Bruyères, soleil, peu d'eau. de boutures — Cap de Bonne Espérance

Ficoïde à tige montante. Mesembryanthemum caulescens hawkins

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Racine chevelue

Tiges ligneuses à la base, redressées, rameuses, velues, de 50 à 80 centimètres.

Feuilles alternes, pétiolées, les inférieures à 5, les supres à 3 digitations ovales, dentées, velues.

Panicule terminale, lâche.

Calice à 10 divisions, Pétales pourpre-noir.

Serre froide, Terre franche, mi-soleil, eau modérée, de graines et d'éclats. du Népaul.

Potentille noire-sanguine Potentilla atrosanguinea hooker

Lith. Desgillet R. des arcis 17

Tige ligneuse d'1 mètre à 1,50. à rameaux glabres, anguleux.
Feuilles à 3 angles dont 1 glanduleux, 1 épineux, 2 nervures. Stipules épineuses caduques.
Têtes multiflores, axillaires, pédonculées.
Fleurs, petites, jaune pâle.

Serre tempérée, terre franche légère, mi-soleil, eau modérée, de graines, de marcottes, de boutures. Nlle hollande

Acacie trompeuse, Acacia decipiens Robert Brown

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse d'1 à 2 mètres.
Feuilles alternes, pétiolées, simples, elliptiques ou en lance, entières, persistantes.
Grappes axillaires, nombreuses, de fleurs pendantes.
Corolle bleue

Serre tempérée, Terre de bruyères, mi-soleil, beaucoup d'eau, de graines de marcottes. N.lle hollande

Platychilier de Cels . Platychilum celsianum

Lith. Desaillet 2 des avis 17.

Tige ligneuse, dressée, d'1 à 2 mètres, à rameaux nombreux, soyeux.
Feuilles alternes, pétiolées, de 3 folioles persistantes, en cœur étroit, petites, soyeuses.
Grappes ramassées en têtes, axillaires, à longs pédoncules.
Corolle jaune d'or
Légume en croissant soyeux
Orangerie, terre légère, soleil, peu d'eau. De graines de marcottes de boutures. Italie, Grèce.

Luzerne en arbre. *Medicago arborea* Linnée.

Lith. Desailly R. des amis 17

Tige ligneuse, dressée rameuse, velue.
Feuilles a[illegible], pétiolées, en cœur, lobées, cotonneuses. Stipules pétiolées, en rein.
Grappes opposées aux feuilles, à pédoncule velu.
Corolle rose, Etamines brunes, entremelées de staminules, Style court.

Serre tempérée, terre de bruyères, mi-soleil, eau modérée. de marcottes. n.lle hollande.

Lasiopétale en Solanum Lasiopetalum Solanaceum.!

Lith. Desaillet R des arcis 17



Tige ligneuse, dressée, peu rameuse d'[illegible]
Feuilles alternes, pétiolées, ovales-pointues, dentées, glabres.
Pédoncules axillaires, solitaires, simples, très longs.
Corolle cylindrique non fendue au dos, carmin vif, ovaire infère.

Serre tempérée, Terre de bruyères, mi-soleil, eau modérée. de Boutures.

Siphocampyle écarlate. Siphocampylus coccineus

Lith. Desaillet R des Cercis 17 Chez Chauvière Rue de la Roquette 104

Racine vivace.
Tige herbacée, dressée, rameuse d'1 mèt
Feuilles alternes, pétiolées, trifides
Pédoncules axillaires et terminaux, simples, très longs,
Fleurons vert foncé, demifleurons très grands, jaune verdâtre, à large tâche brune dessus.

Serre froide, terre ordinaire, soleil, eau modérée, de graines et d'éclats.

Rudbeckie de drummond. Rudbeckia drummondi.

Lith. Desaillet & des accès 17 Chez Pelé rue de Loursine 71.

Tige dressée, peu rameuse, de 50 centimètres.
Feuilles opposées et ternées, pédonculées, ovales-longues, dentées, foncées.
Pédoncules axillaires, solitaires, simples, pendants.
Calice rose à dents vertes à la pointe, Pétales vermillon-foncé.

Serre froide, Terre de Bruyères, soleil, beaucoup d'eau, de Boutures.

Fuchsie à feuilles en scie. Fuchsia serratifolia ruiz et pavon

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez Pelé Rue de l'ourseine 71

Tige en arbre, dressée, rameuse, d'1 à 4 mètres.
Feuilles opposées, de 5 folioles pétiolées, en lance, coriaces, à dents glanduleuses, glabres.
Grappes axillaires imitant un épi.
Fleurs petites, blanches.

Serre tempérée, terre légère, mi-soleil, eau modérée. de Marcottes. Cap de bonne espérance

Cunonie du cap Cunonia capensis. Linnée

Lith. Desaillet r. des arcis 17 Chez Martine rue des bourguignons 27

Tige ligneuse, dressée, rameuse, de 60 centimètres.
Feuilles quaternées, linéaires, glabres, petites, ouvertes.
Fleurs terminales, ramassées, dressées, Calice à sépales petits en lance.
Corolle en godet, rose, Anthères à arêtes, incluses, Ovaire glabre.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de Boutures Cap de Bonne Espér.

Bruyère grêle Erica gracilis. wendland.

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez Martine Rue des Bourguignons 27

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 mètre
Feuilles quaternées, linéaires, ouvertes, glabres.
Fleurs terminales, solitaires, penchées.
Calice en 4 parts, Corolle en tube évasé, rouge, Anthères sans arêtes, ne sortant pas de la corolle

Terre tempérée, Terre de Bruyères, mi soleil, un mouillé. De Boutures Cap de bonne espérance.

Bruyère couleur de feu. *Erica ignescens* Andrews

Lith. Desaillot R. des amis 17.

Chez Bertrand Rue de la roquette 102.

Tige ligneuse, dressée, très rameuse de 60 centimètres
Feuilles opposées, en spatule étroite, glabres.
Pédoncules solitaires, simples, dans la bifurcation des tiges, longs.
Pétales rose violacé.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, soleil, eau modérée. de graines de marcottes, de boutures.

Chirone de fischer. Chironia fischeri.

Litt. Desailler R. des arcis 17 Chez Pelé rue de Loursine 71

Racine fibreuse, vivace
Tige herbacée dressée rameuse, glabre, de 50 centimètres à 1 mètre.
Feuilles du bas verticillées par 3, 4, 5, éparses en haut, linéaires, entières, glauques.
Grappe terminale, bractées courtes étroites, aigues.
Corolle violacée à éperon long, aigu, à gorge entrouverte.

Serre froide, terre ordinaire, mi-soleil, eau modérée. de graines — Italie, grèce.

Linaire pourpre — Linaria purpurea Miller

Lith. Desaillet R des arcis 17 — Chez Pelé rue de Loursine 71

Tige ligneuse, rameuse, redressée, d'1 mètre
Feuilles opposées, linéaires,
Grappes terminales de fleurs bijuguées. Bractées linéaires courtes.
Calice à 3 dents. Corolle à lèvre inférieure large, d'un bleu vif.

Serre tempérée, Terre légère, .. soleil, peu d'eau. de graines de marcottes, de boutures

Sauge rampante Salvia reptans

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez Pelé rue de Toursine 71

Racine vivace
Tige herbacée, dressée, rameuse, carrée, rude, de 50 à 60 centimètres
Feuilles opposées en lance, sessiles, poilues, à grosses dents.
Epis rameux terminaux, s'allongeant considérablement. Bractées longues, poilues.
Corolle à long tube, violette.

Orangerie, Terre légère, soleil, eau modérée, de graines et d'éclats

Verveine veinée Verbena venosa

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez Pelé Rue de Lourcine 71

Tige ligneuse à la base, dressée, rameuse, d'1 mètre
Feuilles opposées, en lance, sessiles, pointues aux 2 bouts, entières, glabres.
Grappes axillaires, en pyramide, longues, Bractées égalant les pédoncelles.
Corolle blanche

Serre tempérée, Terre légère, mi-soleil, eau modérée. de graines de boutures.

Véronique de lindley Veronica lindleyana

Lith. des ailles R des arcis 17 Chez Thibaut rue St maur 45

Tige volubile, soyeuse de plusieurs mètres
Feuilles opposées, pétiolées, en flèche, un peu dentées.
Pédoncules axillaires, solitaires, simples, 2 grandes bractées formant un calice externe.
Corolle orangée, à gorge jaune

Bonne serre tempérée. Terre légère. Soleil, beaucoup d'eau. de graines et de marcottes.

Thunbergie de friery Thunbergia friery.

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez Chauvière rue de la roquette 102

Racine vivace, rameuse.
Souche ligneuse très courte.
Feuilles paraissant radicales, en spatule, grandes, glabres.
Hampe herbacée dressée, de 50 cent. terminée par une panicule à rameaux striés
Calice en entonnoir, blanc, Pétales jaunes.

Serre froide. Terre franche légère, mi-soleil, eau modérée. De graines d'éclats, de boutures.

Statice de fortune *Statice fortunii*

Lith. Desrillet R. des amis 17

Chez Bertrand Rue de la roquette 102

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 à 2 mètres
Feuilles opposées, connées, en lance, aigues, glabres dessus, cotonneuses dessous.
Pédoncules terminaux solitaires, simples.
Pétales blancs à onglet brun, très grandes

Orangerie, Terre substance légère, soleil, peu d'eau. De graines de marcottes de boutures Espagne, portugal

Ciste ladanifere Cistus ladaniferus Linnée.

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée rameuse, mince, d'1 mètre, rameaux poilus
Feuilles opposées, pétiolées, ovales, à poils en étoile dessous.
Pédoncules axillaires, simples, courts, solitaires.
Calice tronqué, pétales soudés, rouge vif, à bord vert

Orangerie, Terre de bruyères, mi-soleil, eau modérée, de graines, de marcottes, de bout

Corrée remarquable Correa speciosa

Lith. de Saillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, tortueuse, rameuse, de 15 à 20 centimètres.
Feuilles opposées, sessiles, dilatées au sommet, terminées par une pointe, charnues.
Pédoncules axillaires et terminaux, simples
Pétales jaune d'or.

Serre tempérée, terre de Bruyères, soleil, peu d'eau. de boutures. Cap de bonne espérance

Ficoïde en doloire Mesembryanthemum dolabriforme hawkins

Lith. des ailles R. des arcis 17

Tiges ligneuses dressées, rameuses, d'1 à 2 mètres
Feuilles herbacées à folioles ovales-pointues, très entières, glabres.
Panicules, terminales, grandes, dressées, à fleurs nombreuses.
Pétales blancs, petits

Orangerie, Cour de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de Marcottes. Japon, Chine.

Nandine domestique Nandina domestica Thunberg.

Lith desaillet R des arcis 17.

Tige charnue, grosse, dressée, peu rameuse, d'1 mètre.
Feuilles embrassantes, opposées, ovales, courbées de coté en faux, très charnues.
Panicule terminale, ramassée en corymbe.
Fleurs écarlates, petites, d'odeur agréable

Serre tempérée, Terre de bruyères, Soleil, peu d'eau. de boutures sèches, de rejetons Afrique méridionale

Rochea à feuilles en faux. Crassula obliqua Aiton

Lith. Descilles-R. des Arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 mètre
Feuilles opposées, sessiles, en spatule, glabres, pointues
Pédoncules courts, axillaires, simples, deux à deux.
Corolle orangée tachée de rouge.

Serre tempérée, bonne terre légère, Mi-soleil, eau moderée, de graines de boutures. Nouvelle hollande.

Eutaxie à feuilles de myrte Dillwynia obovata Labillardière

Lith. de Gillet R. de Arcis 17

Tige ligneuse, dressée, de 2 à 3 mètres, à rameaux nombreux, poilus.
Feuilles (pétioles) verticillées étalées, simples, linéaires, mucronés.
Epis axillaires cylindriques, pendants, solitaires
Fleurs jaunes.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi soleil, peu d'eau. de graines de marcottes Nouvelle hollande

Mimose verticillée Acacia verticillata willdenow.

Lith desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse, rampante, traçante, très rameuse, longue de quelques centimètres.
Feuilles opposées, obovales, persistantes, un peu pétiolées, formant un tapis de verdure. pas de stipules.
Pédoncules terminaux simples, solitaires, très longs, velus.
Pétales plus longs que le calice, blancs, fleurs nombreuses, très petites.

Serre froide, Terre pierreuse, mi soleil, beaucoup d'eau. de graines et d'éclats. Corse, îles Baléares.

Sabline de mahon. Arenaria balearica L'héritier

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, de 60 centimètres, sans épines, à rameaux nombreux, écartés.
Feuilles alternes, pétiolées, à 3 folioles ovales-aigues, cotonneuses en dessous.
Grappes latérales et terminales.
Corolles jaunes, ovaire velu.

Orangerie, Terre franche, soleil, eau modérée. de graines et de boutures, Iles canaries.

Cytise cotonneux Cytisus tomentosus Andrews

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Racine vivace charnue, conique, sans vraie tige.
Feuilles radicales bi ou trijugo-pinnatifides, à lobes en lance, aigus, velus.
Hampe terminée par une ombellule de 8-12 fleurs
Pétales presqu'égaux, les 2 Sup^rs à 3 petites taches, les 3 Inf^rs à large tache brune.

Serre tempérée. Terre franche mêlée de terre de Bruyères, mi-Soleil, peu d'eau, 2e graines Cap de Bonne Espérance

Géranium triste Pelargonium triste Aiton

Lith. Desvilles R. des amis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse de 2 à 4 mètres
Feuilles alternes, bijuinnées, à 5 ou 7 folioles ovales, pointues, incisées-dentées glabres
Panicules terminales et axillaires plus courtes que les feuilles.
Pétales lilas, Tube des étamines pourpre-noir.

Orangerie, Terre ordinaire, mi-soleil, eau modérée. de graines sur couche Indes occident.

Margousier. Melia Sempervirens Swartz

Lith. Desailles. R. des arcis 17

Tige charnue, d'abord couchée, puis redressée, épaisse, rougeâtre, vivace, de 20 centim.
Feuilles opposées, embrassantes, ovales, très charnues, glabres.
Panicules terminales, dressées.
Fleurs en étoile, blanc de lait.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, soleil, peu d'eau. de boutures. Cap de Bonne espérance.

Crassule blanche Crassula lactea Aiton

Lith. Desaillet R. des mais 17

Tige ligneuse, dressée, très rameuse d'1 mètre.
Feuilles verticillées par 4 et 5. linéaires, poilues, ouvertes.
Fleurs terminaux les rameaux, solitaires ou par 2 ou 3
Sépales lancéolés, Corolle en tube renflé, rose, velue. Anthères incluses, mutiques

Serre tempérée, Terre de Bruyères, pas soleil, eau modérée, de graines, de marcottes, de boutures.

Bruyère de Wilmore. Erica Wilmreana (non known)

Chez Vaillant Boulev. des Italiens 25

Racine vivace.
Tige herbacée rampante rameuse de 60 centimètres
Feuilles alternes, à long pétiole, en bouclier, arrondies, à 5 ou 7 angles obtus, mucronées.
Pédoncules très longs, axillaires, solitaires, simples
Pétales rouges, les supr crénelés, les infrs à grosses dents, éperon droit très long.

Serre tempérée, Terre légère, soleil, eau modérée. de graines de boutures. de la colombie

Capucine de lobbian Tropæolum lobbianum

Lith. Desaillet 2 des arcis 17

Chez Lemichez Rue des 3 couronnes 14

Tiges ligneuses à la base, dressées, velues, rameuses
Feuilles elliptiques pointues, à grosses dents, rudes
Pédoncules terminaux, simples ou rameux
Fleurons brun noir, ½ fleurons jaunes, tachés de vert à la pointe.

Serre tempérée. Terre légère. Soleil eau modérée. De graines, de boutures, d'éclats

Rudbeckie remarquable *Rudbeckia speciosa*

Lith. Desaillet Rue des arcis 17

Chez Chauvière Rue de la Roquette 104

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 mètre
Feuilles ternées, sessiles, en lance, entières, à poils très courts.
Ombellules terminales
Corolles velues, écarlates

Terre tempérée, Terre franche légère, soleil, peu d'eau. De boutures sur couche.

Bouvardie éclatante Bouvardia Splendens.

Lith. Desaillet 2 des vrais 17 Chez Thibaut rue St Maur 45.

Tige ligneuse, dressée, rameuse, glabre, rougeâtre.
Feuilles opposées, pétiolées, ovales, dentées, glabres.
Grappes axillaires de 3 à 5 fleurs
Corolles violettes.

Serre tempérée, Terre légère. mi-soleil, eau modérée. de graines, de boutures. du Chili

Gardoquie à fleurs nombreuses. Gardoquia multiflora Ruiz et Pavon.

Lith. de Seillet R des arcis 17 Chez Chauvière Rue de la raquette 104

Racine vivace
Souche très courte presque ligneuse
Feuilles paraissant radicales, à large pétiole, elliptiques, crénelées.
hampes terminées par une ombellule de 10 à 15 fleurs
Corolles violacées, à lobes bifurqués.

Serre froide. Terre franche légère, mi soleil, eau modérée, de graines, d'éclats. d'Afrique.

Primevère denticulé Primula denticulata Smith

Lith Desaillet R des arcis 17 Chez Chauvière Rue de la roquette 104

Racines tubéreuses blanchâtres, charnues, vivaces.
Tiges nombreuses, herbacées trainantes, très rameuses, de 2 à 3 mètres.
Feuilles alternes, pétiolées, en cœur, épaisses, charnues, glabres.
Grappes axillaires, rameuses
Fleurs nombreuses, petites, blanches, à odeur douce.

Pleine terre de serre froide. Terre franche légère, soleil, peu d'eau. de Tubercules. Pour palissades.

Boussaingaultie merveilleuse Boussaingaultia spectabilis.

Lith de Saillet R des arcis 17 chez Bertrand rue de la roquette 102

Racine tubéreuse déprimée, brunâtre.
Feuilles radicales nombreuses, pétiolées, en cœur arrondi, entières, rougeâtres dessous
Pas de Tige
Pédoncules radicaux, nombreux simples, courbés près du calice
Corolle à lobes obtus, ovales, rouge violacé et foncé.

Serre froide, Terre de Bruyères, mi soleil, eau modérée. de graines, de tronçons. de Grèce

Cyclame de cos Cyclamen coüm Miller

Lith de Saillet R des arcis 17 Chez Chauvière Rue de la Roquette 104

Tige ligneuse grêle, très rameuse, velue, d'1 mètre.
Feuilles alternes, en spatule, entières, petites, coriaces.
Epis terminaux s'allongeant beaucoup pendant la fleuraison
Fleurs petites, Corolle à long tube, violettes, à lobes obtus.

Orangerie, Terre franche très légère, mi-soleil, eau modérée. de graines de boutures.

Sélagine à feuilles de myrte. Selago myrtifolia.

Lith. Desaillet R des arcis 17 Jardin du Museum.

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 mètre
Feuilles supérieures opposées pétiolées, elliptiques-lancéolées, entières, mucronées.
Grappes terminales très courtes, comme en tête.
Pétales carmin, Etendard à tache jaune-verdâtre. Calice à 2 lèvres.

Sous tunnière, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. De boutures

Brachysème à ailes larges. Brachysema platypterum

Chez Chauvière Rue de la Roquette 104

Lith. Desailly Rue des amis 17

Racine chevelue, vivace
Tiges herbacées, dressées, peu rameuses, de 60 à 80 centimètres.
Feuilles alternes, en spatule, un peu embrassantes, les inf.res à grosses dents
Pédoncules terminaux, solitaires, longs, renflés sous la fleur.
demi-fleurons violet-clair, fleurons jaune-verdâtre, calice simple.

Serre froide, terre ordinaire, soleil, eau modérée, de graines et d'éclats

Astère glauque . Aster glaucus (non Nees.) Glaucescens.

Lith. Desaillet R. des amis 17

Chez Pelé rue de Lourcine 71

Tige dressée, ligneuse, rameuse, de 60 à 80 centimètres.
Feuilles éparses, sessiles, ovales, très pointues, ouvertes, coriaces, luisantes, ciliées.
Fleurs axillaires sessiles, formant, avec les feuilles, un épi terminal très dense.
Calice aigu plus court que le tube de la corolle qui est ventrue, blanche. Style glabre.

Serre tempérée, Terre de Bruyères. mi-soleil, eau modérée. de boutures sur couche. Nlle hollande.

Lysinème à feuilles de houx. Epacris onosmæflora hooker.

Litr. de Saillet R. des arcis 7 Chez Keteleer Boulevard des Gobelins 4 bis

Tige ligneuse, dressée, simple, glabre, de 60 centimètres

Feuilles alternes, pétiolées ovales, aiguës, dentées, glabres

Pédoncules axillaires, solitaires, à une fleur, moitié plus courts que la feuille.

Calice à tube hémisphérique à dents longues. Corolle non fendue, rouge, Anthères infres barbues.

Capsule ovale, aigue, demi-supère

Serre tempérée, Terre de Bruyères, Arrosée avec modération. De boutures sur couche chaude. Du Brésil.

Siphocampyle brillant. Siphocampylus nitidus Decandolle

Lith. Decaillet-Rousseau 7   Chez Kiéleer Boul. des gobelins 4 bis

Tige ligneuse, redressée, rameuse, de 60 centimètres, rameaux [illegible]
Feuilles opposées, linéaires, charnues, un peu triquêtres, étalées, à papilles [illegible]
Pédoncules axillaires et terminaux simples, solitaires
Pétales safranés, fleurs moyennes

Serre tempérée, Terre de Bruyères, Soleil, peu d'eau. De Boutures [illegible]

Ficoïde brillante Mesembryanthemum micans Linn.

Lith de Jaille R des arcis 17

Tige ligneuse dressée, très rameuse, glabre, d'1 mètre, rameaux rougeâtres.
Feuilles opposées, à court pétiole, ovales-pointues, dentées, persistantes, rougeâtres.
Pédoncules axillaires, solitaires, simples, pendants.
calice écarlate, Pétales violets courts
Baie ovale noirâtre, à chair violette.

Serre froide, Terre de Bruyères, soleil, beaucoup d'eau. de graines et de boutures. du chili.

Fuchsie écarlate. Fuchsia coccinea Linnée

Lith de Saillet R des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, très rameuse, rougeâtre, de 60 à 80 Centimètres
Feuilles quaternées, rapprochées, linéaires, glabres.
Fleurs terminant les ramuscules, rassemblées par 4 à 6, penchées.
Calice petit, Corolle en cloche rose ou blanche, Anthères incluses, à arêtes.

Serre froide, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de marcottes et de boutures. du Cap de B. Esp.

Bruyère acquittée Erica persoluta Linnée

Lith. de Saillet R. des arcis 17

Racine vivace, rameuse
Tige herbacée, rameuse presque nulle
Feuilles en faisceaux, à long pétiole, en cœur, à 5 lobes dentés, obtuses, glabres,
Pédoncules très longs, simples, portant une collerette.
Pétales très grands, dentés, roses rayés de carmin,

Orangerie, Terre franche légère, soleil, peu d'eau, de graines sur couche, d'éclats. Cap de Bonne Espérance.

Monsonie à feuilles lobées. Monsonia lobata willdenow.

Lith. desaillet 2 des arcis 17

Tige simple ou très rameuse, ligneuse, d'1 mètre, rameaux charnus.
Feuilles opposées, embrassantes, obovales, épaisses, charnues, glauques.
Panicule terminale de fleurs pendantes
Fleurs tubulées grandes, à lobes roulés en dehors, rougeâtres.

Orangerie, Terre de Bruyères, Soleil, peu d'eau. De Boutures séchées 3 ou 4 jours. Du Cap de B. Esp.

Cotyled orbiculaire. Cotyledon orbiculata Linnée

Lith. Desaillet R des amis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, carrée, d'1 à 2 mètres
Feuilles opposées, pétiolées, en cœur, dentées, aigues.
Grappes terminales de verticilles, à pétioles et bractées écarlates
Calice renflé à 3 dents, Corolle à lobes latéraux réfléchis, écarlate

Bonne serre tempérée Terre franche riche. Soleil pas d'eau l'hiver, beaucoup l'été. De boutures d'éclats du Brésil.

Sauge éclatante Salvia splendens Ker.

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, de 2 à 3 mètres, Rameaux velus.
Feuilles alternes, pétiolées en cœur, anguleuses ou presque lobées, dentées, persistantes
Ombellules de 30 à 50 fleurs sur des pédoncules axillaires, velus.
Fleurs larges, blanches. Etamines à filets pourpres, glanduleux

Serre tempérée, Terre franche légère mi-soleil, eau modérée. de graines, de boutures sur couche. du Cap.

Sparrmannie d'afrique Sparrmannia africana Thunberg.

Lith. de Saillet R. des arcis 17



Tige simple herbacée, feuillée.
Feuilles à long pétiole, à 3 folioles obovales, ciliées
Pédoncules simples, plus longs que les feuilles.
Pétales grands, rosés à onglet jaune, Styles plus courts que les grandes étamines.

Serre froide, Terre de Bruyères, Soleil, peu d'eau. De Cayeux   Cap de bonne Espérance.

Oxalide rampante   Oxalis reptatrix Jacquin.

Lith. Desaillet & des'avrit 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, Rameaux velus.
Feuilles presqu'en cœur, alternes, pétiolées, à 5 lobes, ondulées dentelées, velues.
Ombellules axillaires à long pédoncule
Pétales sup.rs grenats, les inf.rs rose foncé.

Serre tempérée. Terre franche légère, mi-soleil, eau modérée, de Boutures. du cap.

Geranium de Davey Pelargonium daveyanum Sweet

Lith. Desaillet R des arcis 17

Tige ligneuse couchée, très rameuse glabre, rameaux redressés.
Feuilles alternes, sessiles, en spatule, entières, ou bi-et plus souvent trifides.
Grappes terminales longues, dressées, droites.
Calice à 6 divisions profondes, (sexfide) Corolle verdâtre; odeur très suave.

Serre tempérée, terre ordinaire, soleil. de graines. On le sème tous les ans en pleine terre comme annuel. Barbarie.

Réséda odorant Reseda odorata Linnée.

Lith. de Saillet R. des arcis 17

Tige ligneuse dressée, rameuse, d'1 mètre
Feuilles alternes, linéaires, glabres, pâles en dessous
Grappes longues, terminales
Pétales changeant du violet au bleuâtre

Serre tempérée. Bonne franche, soleil, peu d'eau. De graines, de boutures. de Madère et Ténériffe

Giroflée changeante. Cheiranthus mutabilis

Chevalier.

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 à 2 mètres
Feuilles opposées à 5, 7 ou 9 folioles ovales, dentées, petites.
Grappes terminales
Corolle grande rouge vermillon vif.

Serre tempérée, Terre légère, soleil, eau modérée. de marcottes de boutures. du Cap

Bignone du cap Bignonia capensis.

Lith. Desaillet 2 des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 à 2 mètres.
Feuilles alternes, pétiolées, de 3 folioles elliptiques ou oblongues, soyeuses en dessous.
Pédoncules axillaires portant le plus souvent 3 fleurs.
Etendard rouge, Ailes et carène violet foncé
Légume très velu.
Serre tempérée, Terre légère, Mi-soleil, eau modérée. De graines et de boutures. Nouvelle hollande.

Kennédie rubiconde Kennedia rubicunda Ventenat

Lith. Desaillet R. des arcis 7 Chez Chaumière rue de la roquette 104

Racine vivace
Tige courte dressée, rameuse, velue
Feuilles alternes, pétiolées, en cœur, aigues, crénelées, velues.
Panicule terminale de fleurs nombreuses.
Corolle à lobes linéaires, roulés et tortillés, bleu ciel dessus, violacés dessous.

Serre tempérée, Terre légère, mi soleil, eau modérée. de graines et d'éclats de Thrace

Nordmannie à feuilles en cœur. Borrago orientalis Linnée

Lith. de Saillet R. des arcis 17 Chez Pelé rue de l'oursine 71

Tige ligneuse, très courte, rameuse, glabre.
Feuilles ovales, à court [illegible] dilatés, glabres, ciliées.
Panicules terminales larges
Fleurs larges, rose lilas.

Serre froide, Terre franche très légère, [illegible]. Du Népaul.
Mégasée ciliée Saxifraga ligulata wallich.
[illegible]

Tige un peu ligneuse à la base, à rameaux herbacés glabres, striés.
Feuilles alternes, en spatule, un peu dentées.
Grappe très courte, formant l'ombellule, très large
Pétales étroits, violet clair.

Serre tempérée, Terre franche, soleil, eau modérée. de graines de boutures.

Ibéride à grandes fleurs. Iberis grandiflora

Lith Desaillet R des arcis 17 Chez Pelé rue de l'oursine 71

Tige ligneuse, dressée, rameuse. d'1 mètre
Feuilles alternes, pétiolées, ovales-longues, pointues, denticulées
Fleurs axillaires, solitaires, un peu pédonculées, penchées.
Corolles grandes, non fendues, toutes les anthères velues.

Bonne serre tempérée, Terre de Bruyères, soleil, beaucoup d'eau l'été. de Boutures sur couche chaude

Centropogon fastueux Centropogon fastuosus.

Chez Chauvière rue de la roquette 104

Litt. Desaillot r. des arcis 17.

Tige ligneuse à la base, mince, très rameuse, de 60 centimètres
Feuilles éparses, fasciculées, en alène, molles.
Panicules terminales nombreuses et ramassées.
Fleurs petites, lilas très clair.

Serre tempérée, Terre de bruyères, mi-soleil, eau modérée. de graines, de boutures.

Sélagine remarquable. Selago speciosa

Lith. desaillet r. des arcis 17 Chez Keteleer boulev. des gobelins 4 bis.

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 mètre, Rameaux à duvet très court.
Feuilles par 4, linéaires, obtuses, glabres, ouvertes.
Fleurs terminales, sessiles, par 3 ou 4.
Sépales ovales, Corolles ovales-tubuleuses, à gorge peu resserrée. Anthères incluses, aristées.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, Eau modérée, de marcottes, de boutures. Afrique Septentr.

Bruyère australe. Erica australis Linnée

Lith Desaillet R. des arcis 17 Chez Keteleer Boul des gobelins 4 bis

Tige ligneuse dressée, rameuse, de 60 centimètres.
Feuilles verticillées par 6, rapprochées, très ouvertes, linéaires, à bords rudes.
Fleurs axillaires sessiles, rapprochées en épi, horisontales.
Corolle tubuleuse, visqueuse, rose foncé, Anthères incluses, sans arêtes.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi soleil, eau modérée. de marcottes et de boutures. Cap de B. Espérance

Bruyère à fleurs de vipérine Erica echiiflora Andrews

Lith. Desaillet R des arcis 17 Chez Martine rue des Bourguignons 27

Tige ligneuse, dressée, rameuse, de 2 à 3 mètres. Rameaux velus.
Feuilles (pétioles applatis) ovales-lancéolées, obliques, pointues, velues à 1 nervure.
Grappes axillaires de têtes de fleurs, dépassant les feuilles
Fleurs jaunes.

Serre tempérée, Terre franche légère, mi-soleil, eau modérée. de graines, de boutures. Nelle hollande

Acacie vêtue Acacia vestita Ker.

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez Bertrand Rue de la roquette 102

Tige ligneuse à la base, à rameaux minces, nombreux.
Feuilles opposées, bipinnées, à folioles incisées, glabres.
Pédoncules axillaires, simples
Fleurs moyennes, Pétales blancs, ponctués de violet.

Serre tempérée, Terre franche, soleil, eau modérée. de boutures

Clématite verticillée Clematis verticillata

Lith. Desaillet R. des arcis 17 Chez Chauvière rue de la Roquette 104

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 à 2 mètres
Feuilles alternes, de 6 folioles ovales-lancéolées, un peu courbées, glabres.
Grappes axillaires et terminales de 3 à 5 fleurs.
Pétales jaunes
Légumes cylindriques.
Serre tempérée, terre franche légère, soleil, beaucoup d'eau – de graines de boutures. De Buenos ayres

Casse à corymbes. Cassia corymbosa Lamarck

Litt. Desaillet R des arcis 17 Chez Chauvière R de la roquette 104

Tige ligneuse, dressée, rameuse, poilue, de 60 centimètres
Feuilles alternes, sessiles, ovales-lancéolées, pointues, rudes.
Fleurs axillaires, solitaires, penchées, à pédoncule court.
Corolle à divisions linéaires, roulées, velues, rouge. Anthères très cordées.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de boutures Nouvelle hollande

Styphélie à fleurs tubuleuses Styphelia tubiflora Smith.

Lith. desaillet R. des arcis 17

Chez Chaumière R. de la roquette 104

Tige ligneuse, grêle, dressée, d'1 mètre, à rameaux velus
Feuilles éparses, sessiles, ovales-lancéolées, pointues, sèches, à bords rudes.
Fleurs dans les aisselles des feuilles supérieures, sessiles, formant un épi feuillé.
Calices aigus, Corolle blanche, Etamines incluses, Style glabre.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de boutures. Nouvelle hollande.

Epacride des marécages Epacris paludosa robert Brown

Litt. de Saillet R. des arcis 17 Chez Kételeer Boulev. des gobelins 4 bis.

Tige ligneuse, dressée, grosse, rameuse, sans épines, d'1 à 2 mètres.
Feuilles alternes, à 3 folioles elliptiques, aigues, à aiguillons en dessous
Pédoncules axillaires et terminaux formant une grappe lâche
Calice à 2 dents brun. Etendard large rouge brillant, Ailes dépassant le calice

Serre tempérée, Terre légère, substantielle, soleil, peu d'eau, de boutures des jeunes rameaux sous cloche du Brésil

Erythrine crête de coq Erythrina crista galli Linnée

Lith. de Seuillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse de 2 à 3 mètres
Feuilles opposées, pétiolées, ovales, à 3 nervures, cotonneuses en dessous.
Pédoncules axillaires, solitaires, à 1 fleur, plus courts que la feuille, velus.
Pétales grands, rose tendre, filets des étamines carmins.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, Soleil, beaucoup d'eau, de boutures sur couche chaude. Chine, Cochinchine

Myrte cotonneux Myrtus tomentosa Aiton.

Lith. de Saillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée d'1 à 2 mètres, à rameaux comprimés, rougeâtres.
Feuilles opposées, pétiolées, persistantes, en lance, aigues, luisantes.
Panicules axillaires, trichotomes, à pédoncules longs.
Pétales jaune-clair.

orangerie, Terre de Bruyères, mi soleil, eau modérée. De marcottes et de boutures. Nouvelle hollande

Tristanie à feuilles de laurier rose. Tristania neriifolia
robert Brown.

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, d'1 mètre, à rameaux rouges
Feuilles éparses, ovales-lancéolées, ponctuées en dessous.
Ombellules terminales de 3 à 5 fleurs.
Pétales larges, blancs avec ligne rouge. filaments du disque (staminodes) glanduleux au sommet.

serre tempérée, Terre de Bruyères. mi-soleil, eau modérée. de graines de marcottes de boutures sur couche afrique méridion.

Glandulifeuille ombellée. Diosma umbellata

Lith. Desaillet - R. des arcis 17

Tige ligneuse, penchée, rameuse, de 30 centimètres. Rameaux hispides
Feuilles opposées, cylindriques, obtuses, charnues, couvertes de papules
Fleurs terminales, solitaires.
Calices papuleux. Pétales rose pourpré, étamines dépassant les pistils

Serre tempérée. Terre de bruyères, soleil, peu d'eau. de boutures. Cap de Bonne espérance.

Ficoïde hispide Mesembryanthemum hispidum Linnée

Lith desaillet & Dis arcis 17



Tige ligneuse, très courte, à rameaux foliacés rameux, dentés, oblongs, de 40 à 50 centim.
Feuilles nulles.
Fleurs solitaires, sessiles sur les dents supérieures des rameaux.
Pétales longs de 5 à 6 centimètres, roses.

Orangerie, Terre de Bruyères, Soleil, peu d'eau, de boutures. Amérique méridionale.

Epiphylle remarquable Cactus speciosus Bonpland

Lith. Desailler 2 des arcis 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse
Feuilles alternes, pétiolées, elliptiques, pointues des 2 bouts.
Fleurs axillaires, à pédoncule très court
Pétales jaunes, 5 styles.

Serre tempérée, Terre franche légère, mi-soleil, peu d'eau. de graines, de boutures sur couche de l'Inde

Lin à trois Styles *Linum trigynum* Roxburg.

Litho Desaillet, 2 Des avois 17

Tige ligneuse, dressée, rameuse d'1 mètre à 1,50.
Feuilles alternes, pétiolées, lanceolées, pointues, persistantes.
Fleurs axillaires, ramassées au bout des rameaux, pendantes.
Pétales lancéolés, rouge-brun.

Orangerie, bonne terre de bruyères, mi-soleil, eau modérée, de marcottes pendant 2 ans.

Badiane rouge Illicium floridanum de la Floride, Linnée

Lith. Desvaux des avis 17

Ognon petit noirâtre, de couches concentriques
Tige nulle
Feuilles radicales, à long pétiole, à 3 folioles obcordées, glabres.
hampe dépassant les feuilles, terminée par une ombellule
Pétales en spatule, rose violacé, styles plus courts que les étamines extérieures

Serre froide, terre légère, mi-soleil, peu d'eau. De cayeux. Amérique du nord.

Oxalide violette. Oxalis violacea Linnée

Lith. Desilliet R. des amis 17

Tige ligneuse, dressée, très rameuse, d'1 mètre
Feuilles alternes à long pétiole, en cœur, à 5 lobes profonds, arrondis, dentés.
Pédoncules axillaires longs, terminés par une ombellule de 3 à 6 fleurs petites.
Pétales blancs, les supérieurs mouchetés de rose, odeur aromatique

Orangerie. Bonne terre franche, mi soleil, peu d'eau.

Pelargonium très odorant. Pelargonium odoratissimum

Lith. Desvilles R. des arcis 17

[illegible] ligneuse [illegible] se mettant [illegible] formant [illegible].
Feuilles alternes, à pétiole ailé, ovales, pointues, glabres, denticulées, persistantes.
Grappes terminales de 2 à 6 fleurs.
Pétales blancs. Odeur très suave.
Fruits globuleux, doux, [illegible]. Graines à [illegible] et à 2-5 embryons.
[illegible]
Oranger [illegible] Aurantium [illegible]

Tige ligneuse, basse, dressée, rameuse.
Feuilles alternes, pétiolées, bipinnatifides, à lobes en lance, dentés, ridés.
Pédoncules axillaires, simples, terminés par une ombellule de plusieurs fleurs
Pétales en spatule, presqu'égaux, bruns, bordés et tachés de blanc

Orangerie. Terre franche, mi-soleil, peu d'eau. De Boutures. Cap de bonne espérance.

Pelargonium à cinq plaies *Pelargonium quinquevulnerum* Persoon.

Lith. Desaille & Ses amis 17

Tige ligneuse à la base, dressée, rameuse, poilue, de 60 centimètres
Feuilles alternes, ovales, dentées, sessiles.
Têtes terminales enveloppées de bractées foliacées
Corolles poilues violettes

Serre tempérée, Terre franche légère. mi-soleil, eau modérée. de Boutures.

Centrathère des indes Centratherum indicum

Chez Kételeer Boul. des Gobelins 4 ter.

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 mètre
Feuilles verticillées par 4, linéaires, ciliées, très rapprochées
Fleurs terminant les petits rameaux, presque sessiles, par 2, 3 ou 4.
Sépales ovales mucronés. Corolles tubuleuses, un peu en massue rose; Antheres incluses mutiques.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, gri-soleil, eau modérée. de graines de marcottes de boutures. Cap de B. Esp.

Bruyere colorante Erica colorans Andrews

Lith. Desaillet R. des arcis 17

Chez Mourtine Rue des bourguignons 87

Tige ligneuse, brossée, rameuse de 60 centimètres.
Feuilles grandes linéaires, couvertes glandes
Suc [illegible] à travers lacunes, pénétrant [illegible]
Corolle blanche, pétales en dehors, écailles pétaloïdes, [illegible] pas d'odeur.

Semefaide, Cour de Cuyères, mi-Soleil, eau modérée, de graines, de boutures, Exp. de Bruno déposeur.

Gnidierone à feuilles de pin. Gnidia pinifolia Linnée.

Chez Rebillon Boulev. des gobelins 4 fr.

Tige dressée presque toujours simple, de 2 centimètres, herbacée,
Feuilles en faisceau, à 3 folioles linéaires, en cœur au sommet, tachées de 2 points
Boucules sortant du faisceau, simples, plus longs que les feuilles
Pépales réfléchis et taché au sommet. Pétales rouges, Styles plus courts que les petites étamines

Serre tempérée, terre de Bruyères, mi-soleil, peu d'eau. De Cayeux. Cyp. de Bonne Espérance.

Oxalide à plusieurs feuilles. Oxalis polyphylla Jacquin

Chez Pelletier de l'Oncle [illegible]

Tige ligneuse, dressée, rameuse, velue.
Feuilles alternes à dents rares. les supérieures entières.
Pédoncules longs, axillaires, solitaires, simples.
Fleurs de 5 centimètres de large. fleurons rouge brun à bord jaune, fleurons bruns

Serre tempérée, Terre franche légère, mi-soleil, eau modérée. De graines de boutures

Gaillarde remarquable — Galardia Speciosa

Chez Pelé rue de l'ouragan 78

Tige ligneuse, dressée, rameuse, glabre, d'1 mètre.
Feuilles verticillées par 4, linéaires, raides.
Fleurs axillaires, à pédoncule court, tournées du même côté, bractées éloignées du calice.
Sépales en lance, Corolle en cloche, violacée. Anthères nues, exclues, Ovaire glabre.

Serre froide, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. De graines, de marcottes, de Boutures. D'Europe.

Bruyère herbacée. Erica herbacea Linnée

Chez Bertrand rue de la roquette 102

Tige ligneuse à la base, dressée, à rameaux herbacés, haute de 50 centimètres.
Feuilles opposées, sessiles, ovales ou en lance, pointues denticulées, glabres.
Panicule terminale, trichotome de pédoncules verticillés.
Corolle à tube renflé, poilue, blanc de lait.

Serre froide, Terre franche, mi-soleil, eau modérée, de graines et d'éclats.

Pentstemon en doigt Pentastemon digitale Nuttall.

Lith. [illegible] et passe du cœur 36

Tige ligneuse à la base, dressée, rameuse, de 60 centimètres
Feuilles alternes, à 5 lobes principaux à grandes dents, larges, pétiolées
Fleurs sur de longs pédoncules simples ou divisés, axillaires et terminaux en panicule
Fleurons peu nombreux jaunes, demi-fleurons sur plusieurs rangs, formant une tête rose

Serre tempérée, bonne terre franche. Soleil, eau modérée, d'éclats de boutures

Chrysanthème pompon de chine Chrysanthemum matricarioïdes.

Lith. Pelletier, pas. du caire 36. Chez Bertrand Rue de la roquette 102.

Tige ligneuse à la base, dressée, à rameaux herbacés, haute de 60 centimètres
Feuilles opposées, pétiolées, ovales, pointues glabres
Pédoncules terminaux d'1 à 3 fleurs
Corolle longue, d'un beau jaune d'or.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, Soleil, peu d'eau, de boutures sur couche. du Mexique

Bouvardie jaune Bouvardia flava Decaisne.

Chez Chauvière Rue de la roquette 104



Tige ligneuse, dressée, raide, rameuse, poilue, de 60 centimètres
Feuilles éparses, à peine pétiolées, en cœur très pointues, planes, recourbées.
Fleurs axillaires, solitaires, pédicellées, penchées, formant grappe
Calice aigu, Corolle trois fois plus longue, en cloche tubulée

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de boutures de la Nouvelle hollande.

Epacride en cloche. Epacris campanulata Loddiges.

Lith Pilletier pass. du caire 2.

Chez Ketelaer Boul. des Gobelins 4 ter

Tige ligneuse à la base, dressée, rameuse, pubescente, de 30 centimètres.
Feuilles opposées, à long pétiole, en cœur aigu, inégalement crénelées, pubescentes.
Verticilles rapprochés en épis terminaux.
Corolle à tube droit, à double dent de chaque côté, rose violacé

Orangerie, Terre légère, Soleil, jeu d'eau. de graines d'éclats. d'Italie, péloponèse, cochinchine.

Lamier du gargan Lamium garganicum Linnée

Du Muséum

Lith. Pellicon. pas. du caire 36

Tige un peu ligneuse à la base, dressée, glabre, à rameaux nombreux herbacés.
Feuilles opposées, amincies en pétiole court, ovales-lancéolées, très aigues.
Panicule terminale lâche.
Corolle blanche

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil. De Boutures. De Mexico.

Gérontogée de deppei Oldenlandia deppeana Chamisso.

Chez chauvière rue de la Roquette 104

Lith. Pelletier pas. du caire 37

Tige ligneuse à la base, dressée, rameuse, d'1 mètre
Feuilles opposées, à court pétiole, en lance
Fleurs axillaires sur des pédoncules simples ou bifides.
Corolle quadruple du calice, jaune, à lobes aigus, dépassant les étamines.

Serre tempérée, Terre légère, soleil, eau modérée. de boutures sur couche de la Jamaïque.
Lisianthe à feuilles longues *Lisianthus longifolius* Linnée

Litt. Pellatier; pas. du cahier 37

Racine vivace, rameuse
Tige herbacée, dressée, rameuse, glabre, cylindrique, de 60 centimètres
Feuilles opposées, linéaires, aiguës, lisses, glauques.
Pédoncules axillaires et terminaux, solitaires, simples, longs.
Calice aigu, Corolle rose pourpre

Serre tempérée, bonne terre de Bruyères, mi-soleil, peu d'eau. de graines de boutures. D'Afrique australe

Chirone à feuilles de lin Chironia linoïdes Linnée.

Lith. Pellatier, pas. du cairn 37

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 à 2 mètres.
Feuilles opposées, à pétiole articulé, simples, ovales, pointues, persistantes.
Pédoncules axillaires et terminaux, trichotomes, formant panicule.
Calice en cloche, à 5 dents, Corolle blanche très odorante.

Serre tempérée, Terre franche légère, soleil, eau modérée, de greffe en fente sur le jasmin officinal

Jasmin genouillé Jasminum Geniculatum Iles des amis ventenat.

Lith. Pelletier pas. du caire 37

Tige ligneuse, rameuse, grêle, grimpante, très glabre, rougeâtre.
Feuilles opposées, à pétiole très court, lancéolées. Des glandes axillaires.
Fleurs terminales et axillaires, solitaires ou fasciculées.
Corolles en entonnoir, jaunes, à odeur de ravenelle.

Orangerie, Terre franche légère, Soleil, eau modérée. De graines d'amérique sur couche. Virginie, Caroline.

Gelsémier luisant. Bignonia Sempervirens Linnée

B.

Lith. Pellétier, pas. du carré 35

Tige ligneuse, droite, rameuse, glabre, de 75 centimètres.
Feuilles alternes de 11 à 21 folioles oblongues, un peu échancrées au sommet.
Grappes axillaires, longues.
Corolle rose tendre pourpré.

Orangerie, Terre très légère, soleil, eau modérée, de graines, de boutures. Nouvelle hollande

Swainsonie à feuilles de coronille Swainsonia coronillæfolia Salisbury

Lith. Pelletier. pas. du caire 36.

Tige ligneuse, tortue, rameuse, d'1 à 2 mètres
Feuilles éparses, linéaires, entières, glabres, les supérieures presque cylindriques.
Ombellules latérales, pédoncules glabres.
Pétales glabres, blancs, tortillés, linéaires.
Capsules à 2 éperons.

Serre tempérée. Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de Graines et de marcottes. Nle Hollande

Vaubier à fruit petit. hakea microcarpa Robert-Brown.

Tiges ligneuses en arbrisseau, dressées, d'1 mètre 50 centimètres, à rameaux nombreux, épineux.
Feuilles alternes, fasciculées, en spatule, à peine crénelées, petites, luisantes.
Grappes axillaires et terminales de fleurs nombreuses, formant panicule.
Fleurs petites, glabres, Pétales blancs.

Orangerie, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de Marcottes. Nouvelle hollande

Bursaria épineux Bursaria Spinosa Cavanilles

Lith. [illegible] pas. du caire 36.

Tige ligneuse, dressée, rameuse sans épines de 2 à 3 mètres. rameaux anguleux.
Feuilles alternes de 12 à 50 pinnules portant 30 à 40 folioles très petites, elliptiques-longues pubescentes.
Têtes de fleurs disposées en grappes axillaires égalant les feuilles.
Pétales et étamines jaunes.

Serre tempérée. Terre franche légère. mi-soleil eau modérée. de graines de marcottes de boutures. Nlle holl.

Mimose d'esterhazie   Acacia dealbata Link

Lith. pas. du caire 36

Tige herbacée, dressée, rarement rameuse, cylindrique, de 30 centimètres.
Feuilles linéaires, longues, molles.
Fleurs terminales à spathes foliacées, pointues.
Pétales presqu'égaux, obtus, orange bigueté à ligne jaune.

Serre tempérée, Terre franche légère, mi-soleil, peu d'eau. de Cayeux. Cap de bonne espérance

Morée des collines — *Morœa collina* Thunberg.

Du Muséum

Tiges dressées, herbacées, simples, glabres, laiteuses, d'1 mètre
Feuilles opposées, presque sessiles, oblongues lancéolées, entières, glabres.
Ombellule dressée, terminale
Fleurs rouges, petites, à odeur de vanille

Serre froide. Terre très légère, soleil, beaucoup d'eau. De graines, d'éclats. Amérique septentr.

Asclepiade incarnate Asclepias incarnata Linnée

Tiges en touffe, dressées, rameuses, [illegible]

Feuilles 3 par 3, un peu pétiolées, lancéolées, coriaces, [illegible] en barbes de plumes.

Pédoncules [illegible], [illegible], terminaux.

Corolle rose ou blanche, simple ou double, [illegible] à la gorge [illegible]

Orangerie. Bonne terre [illegible], beaucoup d'eau, de graines, [illegible]

Laurier rose [illegible] Nerium oleander [illegible]

Tige ligneuse dressée, d'1 mètre, à rameaux flexibles.
Feuilles alternes de 9 à 11 folioles, obcordées, glauques, stipules orbiculaires, grandes.
Ombellules sur un long pédoncule axillaire.
Pétales jaunes.

Serre tempérée, Terre franche, Soleil, peu d'eau. De graines, de marcottes. Espagne Italie.

Coronille de valentin Coronilla valentina Linn.



Tige ligneuse, dressée, grêle, d'1 mètre à 1,50, rameaux minces, sarmenteux
Feuilles alternes, à court pétiole, ovales-lancéolées, poilues,
Grappes axillaires et terminales pendantes, le plus souvent de 3 fleurs.
Pétales ouverts ovales, beau bleu, Anthères conniventes.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de boutures. Nouvelle hollande.

Pollye à feuilles variables. Billarderia fusiformis. Labillardière.

Lith. desailles R. des arcis 17

Tige ligneuse, couchée, prenant des radicelles, glabre, rameuse
Feuilles opposées, pétiolées, ovales-pointues, à grosses dents, glabres, pâles en dessous.
Pédoncules terminaux ? et axillaires, solitaires, simples, longs.
Corolle violet clair, bordée de violet foncé.

Bonne Serre tempérée, Terre de bruyères, Soleil, eau modérée de Boutures Indes orientales

Torenie d'asie *Torenia asiatica* Linnée

Lith. Pellerin, rue du cadran 37

Chez Bertrand rue de la Roquette 102

Tige ligneuse, grimpante, rameuse, de plusieurs mètres
Feuilles opposées, pétiolées, ovales-lancéolées-pointues.
Pédoncules solitaires, bifides, au bout de petits rameaux
Fleurs très grandes, pendantes, Corolles violacées veinées de rouge

Serre tempérée, Terre franche, soleil, eau modérée. de boutures.

Bignone striée Bignonia picta Kunth speciosa.

Lith. Pelletier. pass. du caire 37

Chez Chauvière rue de la Roquette 104

Tige ligneuse, dressée, rameuse, de 40 à 50 centimètres
Feuilles à pétiole glanduleux, en spatule longue, pâles.
Pédoncules axillaires, solitaires, simples, longs.
Corolle rouge foncé dehors, jaune ponctuée de rouge en dedans.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de 60 toises Nouvelle Hollande.

Sténochile maculé Stenochilus maculatus Kor.

Lith. et Imp. Jolie rue St Marque 4 Chez Thibaut Rue St Maur 47

Tige ligneuse, courte, tortue, peu rameuse.
Feuilles rapprochées, à pétiole court, elliptiques-sinuées
Panicule terminale très rameuse formant des crêtes à pédoncules aplatis.
Calice bleu, pétales blancs.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, Soleil ou modéré. d'éclats de boutures.

Statice arbrisseau. Statice frutescens.

Chez Letellier, boul. des gobelins 4 ter

Tige herbacée, très grêle, pendante, très rameuse, ... articulée.
Feuilles ovales, pétiolées, entières, très petites.
Grappes axillaires, pendantes, de peu de fleurs.
Calice à 5 dents aiguës, Corolle en tube à 5 dents arrondies, écarlate.

Serre tempérée, Terre légère, Soleil, eau modérée. De boutures.

Russélie en jonc. Russelia juncea.

chez Bertrand rue de la Magdeleine n.12

Tige ligneuse à la base, faible, rameuse de 50 centimètres
Feuilles verticillées par 6 à 10, linéaires, plus glanduleuses.
Pédoncules axillaires, solitaires, uniflores longs.
Pétales bleu-violet

Serre tempérée. Tige légère, mi-volet, eau-modérée, 2 boutures.

Trémandre verticillée Tremandra verticillata

Chez Bertrand rue de la roquette 102

Tige ligneuse à la base, dressée, rameuse, de 50 centimètres.
Feuilles éparses, linéaires, très pointues, raides.
Grappe terminale de 6 à 10 fleurs
Calice à ailes violettes-pourprées, Corolle à carène aigrettée. Étamines sans arêtes

Sous-tempérée, bonne terre franche légère, mi-soleil, eau modérée. de graines, de marcottes, de boutures

Polygala linéaire   Polygala linearis.

frères Cels chaussée du maine

Tige ligneuse, droite, rameuse, d'1 mètre
Feuilles opposées sur quatre rangs en croix, très serrées, linéaires, obtuses.
Têtes terminales entourées de bractées larges et pointues.
Fleurs à long tube, un peu poilues en dehors, rose foncé.

Serre tempérée, Terre de Bruyère, mi-soleil, eau modérée. De Boutures

Lachnée pourprée   Lachnaea purpurea

Chez les frères Celi chaussée du maine 77

Tige ligneuse, droite, rameuse, un peu velue, de 2 à 6 centimètres.
Feuilles éparses, sessiles, elliptiques, très pointues, velues, très ouvertes, vertes.
Fleurs axillaires, solitaires, pendantes, à court pédoncule, tournées du même côté.
Corolle à divisions obtuses, ondulées ou droites, blanches, tubuleuses.

Serre tempérée, terre de bruyère, arrosements modérés, de marcottes et de boutures. Nouvelle Hollande.

Épacride blanc de neige. Epacris nivalis. Graham.

Imp. lith. [illegible]

Chez [illegible]

Tige ligneuse, dressée, très rameuse, de 60 centimètres, à rameaux grêles.
Feuilles opposées, pétiolées, ovales-lancéolées, aiguës, glabres.
Têtes terminales d'un grand nombre de fleurs. 4 Bractées ovales pour involucre
Corolle rose (glabre d'après sprengel)

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de marcottes et de boutures Nouvelle hollande

Pimélée des bois Pimelea sylvestris Robert Brown

Lith. Pelletier pass. du caire 55 Chez Thibaut rue St maur 47

Racine vivace
Tige herbacée, dressée, rameuse, carrée
Feuilles opposées, pétiolées en cœur, dentées velues surtout en dessous.
Verticilles de 3 à 6 fleurs, formant des épis terminaux, à bractées obcordées.
Calice à 5 dents Corolle bleu pâle, lèvre inférieure à taches blanchâtres

[illegible] tempérée, soleil, peu d'eau, terre [illegible] [illegible] de boutures [illegible] de Couleur

Sauge [illegible] *[illegible] [illegible] [illegible]*

 Chez [illegible]

Tige ligneuse à la base, dressée, glabre, en zig-zag, à rameaux herbacés.
Feuilles alternes, à peine pétiolées, en lance, aigues, dentées, lisses, à fortes veines.
Epis axillaires droits, de peu de fleurs
Corolle à 5 lobes ondulés, lilas clair.

Serre tempérée Terre légère, Soleil eau modérée, de boutures, d'éclats Bengale
Ruellie à feuilles de pêcher Ruellia persicifolia Lindley

Litte Pelletier pass du caire 56 Du Muséum

Tiges ligneuses grimpantes, faibles, rameuses, glabres, de 2 mètres.
Feuilles alternes, à long pétiole s'enroulant, en flèche, échancrées en cœur à la base.
Pédoncules axillaires longs, solitaires, glabres.
Calice à divisions très aigues. Corolle grande pourpre violacé

Orangerie, bonne terre franche, soleil, beaucoup d'eau l'été, de graines, d'éclats, de boutures. Mexico.

Ostérie grimpante Maurandia semperflorens Jacquin

Litho Pelletier pass. du caire 36

Tige charnue très courte formant souche
Feuilles rapprochées en rosette, sessiles charnues, triquètres à dents cartilagineuses, et fils nombreux
hampe dressée, de 10 centimètres, terminée par un épi de peu de fleurs, bractées pointues blanches.
Corolle verdâtre.

Orangerie, Terre sableuse, soleil, peu d'eau, de rejetons — Cap de bonne espérance

Aloës toile d'araignée — Aloë arachnoïdes Thunberg

Lith. Pelletier pass. du caire 56



Tige ligneuse à la base, dressée, glabre, d'1 mètre, à rameaux nombreux, herbacés.
Feuilles opposées et fasciculées, linéaires, à dents éloignées, persistantes
Grappes terminales à bractées linéaires longues.
Corolles capucine, à centre brun avec 5 raies vertes

Serre tempérée, terre de Bruyères, mi soleil, eau modérée. de graines de boutures Amérique australe

Hémitome arbrisseau hemimeris linearis willdenow

Lith Pelletier pass du caire 56

Racine vivace
Tige herbacée, dressée, peu rameuse, de 60 à 90 centimètres
Feuilles alternes, s'embrassant, larges, en épée pointues, de 30 centimètres
Panicule terminale de fleurs nombreuses, penchées
Pétales blancs, les extérieurs rabattus

Sous arbrisseau ... , ... de ... et ... pleine terre
Arthropode à appendices Arthropodium cirrhatum

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 à 2 mètres
Feuilles alternes, à court pétiole, lanceolées pointues, entières, luisantes.
Pédoncules axillaires, courts, terminés par une tête plane à bractées violettes
Calice velu, Corolle bleu très clair

Orangerie, bonne terre franche. Soleil, peu d'eau. de marcottes de Madère

Globulaire à feuilles de Saule Globularia salicifolia Aiton

Lith. Pelletier pass. du Caire 56

Tige ligneuse, faible, [illegible], rameuse, d'1 mètre, laineuse.
Feuilles opposées, finissant en pétiole court, ovales, veinées.
Panicules terminales à long pédoncule
Corolle grosse, à lèvre supérieure très courte, violet-foncé.

Serre tempérée, Terre de bruyère, mi-ombre, [illegible]. Par graines de boutures
Calcéolaire violette Calceolaria arachnoidea

Racème ovale
Tige nulle
Feuilles radicales, linéaires en alêne, canaliculées, poilues sur les bords,
longues env., grappe terminale à bractées rougeâtres, linéaires
Fleurs blanches avec une large bande verte au milieu de chaque pièce

Serre tempérée, terre légère, soleil, peu d'eau. De cayeux. Cap de Bonne Espérance

Albuca à fleurs vertes   Albuca viridiflora Jacquin.

De [illegible]

Racine vivace rameuse
Tige presque nulle ou très courte charnue.
Feuilles presque radicales, à long pétiole, en cœur, à lobes dentés, velus.
Pédoncules en hampes terminées par une ombellule de 8 à 10 fleurs, souvent deux ou trois réunis de 1/2 à 2 centim.
Calice vésiculeux, corolle à limbe plane de 5 lobes en cœur ou dentelés, rose ou blanche.

Terre tempérée, Terre de bruyères, mi-soleil, peu d'eau, de graines de boutures. De Chine

Primevère de la chine *Primula praenitens* hor.

Tiges herbacées dressées, simples, de 60 centimètres
Feuilles éparses, lancéolées, glabres
Pédoncules en ombellule terminale, dichotomes
Pétales orangés, les internes jaspés de rouge

Pleine terre, Terre franche légère, mi-soleil, peu d'eau. D'éclats
Alstroemère orangée   Alstroemeria aurantiaca
Du Muséum.

Ognon allongé, petit. Tige herbacée de 8 [illegible]
Feuilles alternes, engainantes, linéaires, élargies à la base, dépassant la tige
Epi floral, terminal, de 5 à 6 fleurs
Pétales ovales blancs, à large tache pourpre à la base.

Serre froide ou châssis, terre de bruyère, mi-soleil, peu d'eau, par cayeux. du cap

Mélanthe à feuilles de jonc Melanthium junceum Jacquin.

Tige ligneuse, dressée, de 60 centimètres, rameaux nombreux formant une boule arrondie
Feuilles éparses, sessiles, en spatule large, luisantes, foncées.
Têtes terminales de 6 à 10 fleurs sessiles.
Corolle rose à odeur suave.

Serre tempérée, terre de bruyères, mi-soleil, eau modérée. De greffes sur la lauréole

Daphne dauphin Daphne delphina.

Racine vivace, tubéreuse
Tige herbacée, dressée, simple, grêle, de 2 mètres
Feuilles alternes, engainantes, ovales étroites, beau vert.
Épi terminal, simple ou rameux
Corolle à lèvre supre de 3 lobes en spatule, ponceau, lèvre infre jaune ponctuée de rouge.

Orangerie, Terre de Bruyères, soleil, peu d'eau l'hiver; beaucoup l'été, d'Eclats. du Brésil
Balisier à feuilles étroites Canna angustifolia Linnée

Lith. Neinfeldt rue St Marguerite 43

Ognon volumineux
Tige herbacée, dressée, rameuse, d'1 mètre
Feuilles éparses un peu pétiolées, ovales lancéolées, à nervures parallèles.
Grappe terminale de plusieurs fleurs pendantes
Corolle roulées, à grosses papilles, sillon nectarifère barbu, roses ou blanches. odeur suave

Serre froide. Terre de Bruyères. mi-soleil, peu d'eau. de cayeux du japon.
Lis magnifique Lilium speciosum thunberg lancifolium.

Lith. Pelletier, pas. du coire 37

Tige ligneuse, dressée, rameuse, un peu poilue, de 50 centimètres.
Feuilles ternées, à court pétiole, ovales, obtuses.
Panicule terminale de pédicelles ternés, trifides.
Corolle à 5 ou 6 lobes écarlates, à tube jaune au moins double du calice. 5 à 6 Etamines

Bonne serre tempérée, Terre légère, Soleil, eau modérée. De Boutures sur couche chaude.

Rondelétie remarquable. Rondeletia Speciosa.

Lith. Pelletier pass du caire 36 Chez Lemichez rue des 3 Couronnes 14

Tige ligneuse, dressée, rameuse
Feuilles opposées, pétiolées, ovales-pointues, dentées.
Pédoncules axillaires, solitaires, simples
Corolle bleu clair, lobes latéraux violet foncé, lobe inférieur à large tache jaune.

Terre tourbeuse, Terre légère, mi-soleil, eau modérée, De boutures.

Dentule en torénie — Dentula torenioïdes

Lith. Pellicier pass du caire 86

Chez Bertrand rue de la roquette 102

Tige ligneuse, très rameuse, très faible, trainante ou volubile, d'1 mètre.
Feuilles alternes, à 5 digitations linéaires, mucronées. Stipules très petites, linéaires.
Pédoncules comme opposés aux feuilles, très longs, à une fleur et 2 bractées.
Étendard large, cramoisi à cœur jaune. Ailes pourpres.

Serre tempérée. Terre de Bruyères avec terreau. Soleil, peu d'eau. De Boutures. Nouvelle hollande.

Gompholobe à fleurs grandes. Gompholobium polymorphum

Robert Brown

[illegible]

Tige ligneuse, dressée, rameuse, glabre
Feuilles éparses, finissant en pétiole, à 1,2,3 ou plusieurs lobes pointus entiers, bifides ou dentés
Grappes terminales, pédoncules souvent bijugués
Fleurs petites, blanches.

Orangerie, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de boutures

Grevillée de drummond Grevillea drummondi

Lith. Pelletier pas du caire 36

Chez chauvière rue de la roquette 104

Tiges herbacées dressées, glabres, cylindriques, de 60 centimètres
Feuilles éparses, à pétiole large, ovales-lancéolées, pointues.
Ombellule terminale de 3 à 6 fleurs pédonculées
Corolle rouge-brun à bord vert, tigrée de brun.

Orangerie, Terre franche légère, soleil, eau modérée. De graines et d'éclats.

Alstroémère perroquet Alstroemeria psittacina

Lith. Pelletier pas du caire 36 Chez Pelé rue de l'oursine 71

Tige ligneuse à la base, faible, rameuse
Feuilles alternes, pétiolées, ovales, dentées, glabres.
Panicule terminale, à fleur isolée dans chaque bifurcation.
Corolle jaune, tachée de brun à la lèvre supérieure.

Serre tempérée, terre légère, mi-soleil, arrosements modérés. De boutures

Cultriles à feuilles grandes Cultrales macrophylla

Chez Kolikov Boul. des gobelins 4:

Tige ligneuse, dressée, rameuse, de 60 centimètres.
Feuilles quaternées, presque sessiles, elliptiques-lancéolées, (glabres d'après Decandolle);
2 à 4 fleurs terminant les rameaux, bractées éloignées du calice.
Sépales linéaires. Corolle à tube bossué, ondulé, difforme. Anthères nues, ovaire glabre.

Serre tempérée, Terre de Bruyères. Mi-soleil, eau modérée. De boutures.

Callune ondulée Erica Westphalingia

Lith. Doudet rue d. caire 56 — Chez les frères Cels Chaussée du maine

Tige ligneuse, dressée, d'1 mètre, à rameaux un peu velus
Feuilles éparses, presque sessiles, linéaires, pointues, raides.
Grappes terminales lâches, pédicelles longs, Bractées petites à leur base
Calice à ailes ovales pointues, pourpre-vif en dedans. Carène à aigrette. anthères nues.

Serre tempérée, Terre légère, mi-soleil, eau modérée. de graines, de boutures sur couche. Afrique australe.

Polygala à bractées. Polygala bracteolata Linnée

Lith. Pellutier pass du caire 56 du Muséum

Tige ligneuse à la base, faible, velue, rameuse, de 20 centimètres, à épines axillaires
Feuilles alternes, oblongues lancéolées, presque sessiles, velues.
Fleurs en grappes rameuses formant une petite panicule terminale.
Calice à divisions linéaires velues, Corolle bleue, à lobes obtus.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi soleil, eau modérée, de boutures. Amérique tropiquale

hydrolée épineuse. hydrolea spinosa Linnée

Lith pilletier pass du cuire 36 Chez Ketelèer Boulev. des gobelins 4.tes

Tige ligneuse, effilée, rameuse, d'1 à 2 mètres.
Feuilles opposées, pétiolées, simples, ovales-lancéolées, coriaces, persistantes.
Pédoncules terminaux à 2 ou 3 fleurs.
Calice très court, à dents obtuses, Corolle blanche, odorante, souvent semi-doubles

Serre tempérée, bonne terre franche, soleil, eau modérée. De graines, de rejetons, de marcottes. Du Cap B.E.

Jasmin glauque .. Jasminum ligustrifolium Lamarck

Chez [illegible] Rue de la roquette 104

Ognon moyen, pas de Tige.
Feuilles portant de l'ognon, en lanières, molles, courbées en gouttière, de 40 centim.
Hampe dressée, de 25 centimètres, terminée par une grappe à bractées très petites.
Pétales blancs, collés en cloche, Anthères bleues.

Serre tempérée, Terre franche légère, Soleil, peu d'eau. de cayeux.

Scille romaine Scilla romana

Chez Pelé rue de l'oursine 7.

Tige ligneuse à la base, faible sans être grimpante, à rameaux herbacés, sillonnés
Feuilles alternes, un peu pétiolées, ovales larges, pointues, glabres, très entières.
Épis terminaux, longs, Bractées petites glabres.
Calice poilu, Corolle à lobes en cœur, blanche

[illegible] Terre franche, grand soleil, beaucoup d'eau l'été. de graines sur couche. [illegible]

Dentelaire grimpante Plumbago scandens Linnée

Chez Chaumière rue de la [illegible]

Tige charnue, sphérique de la grosseur du poing, une douzaine de côtes
pas de feuilles. tubercules à soies nombreuses, 3 à 4 épines brunâtres
Fleurs sessiles, au sommet de la tige
Calice brunâtre Pétales sur 2 rangs, lancéolés, jaunes, stigmate pourpre.

Icosandrie, Terre de Bruyère, Soleil, peu [illegible]

Echinocacte d'otton   Cactus ottonis

[illegible] Atelier de St Lieu

Tige ligneuse dressée rameuse, d'1 mètre, glabre. Rameaux effilés.
Feuilles opposées comme imbriquées sur 4 faces, linéaires, obtuses, glabres.
Têtes terminales sessiles, de 5 à 10 fleurs, à bractées rougeâtres
Corolle tubulée, velue, à lobes lancéolés, ouverts, blanche ou rose.

Sexe tempérée, Cours de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de mauvaises [illegible]
Lachnée à têtes Passerina [illegible]
[illegible]

Tige herbacée, très rameuse, dressée, très poilue, d'1 mètre ½.
Feuilles alternes, sessiles, lancéolées, coupées en cœur, à poils glanduleux.
Grappes axillaires et terminales pendantes, à bractées en cœur étroites.
Calice blanc très poilu. Corolle jaune

Orangerie. Terre franche, Soleil, beaucoup d'eau, De graines, d'éclats. Taurie, Asie mineure.

Onosma géant   Onosma giganteum Lamarck

Lith. [illegible]

Tige ligneuse, dressée, rameuse, velue; 1 mètre
Feuilles éparses et fasciculées, à court pétiole, ovales oblongues, aiguës, velues.
Pédoncules solitaires ou fasciculés, terminaux, poilus.
Corolle en cloche, rouge, rose, pourpre, violacée, blanche, &c, simple ou double

Serre tempérée, Terre de bruyère, mi-soleil, eau modérée. De graines, de marcottes, de boutures. Indes orient. Japon

Azalée des Indes — Azalea indica Linnée

[illegible]

Tige un peu ligneuse à la base, branchue au haut, droite, blanchâtre.
Feuilles alternes, lancéolées, amincies des 2 bouts, blanches et laineuses en dessous.
Panicule terminale évasée conique.
Calice à écailles sèches, blanches brillantes oblongues aiguës Corolles jaunes

... Inde, Terre légère, soleil, eau modérée, de graines
Gnaphale blanchâtre Gnaphalium albescens

Tige ligneuse, dressée, rameuse, velue, d'1 mètre
Feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, pointues, à grosses dents, velues
Epis axillaires et terminaux, à bractées très entières
Corolle à tube velu, à limbe bleu violacé glabre, style très velu.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. De graines de boutures sur couche. Nouv. hollande

Scævole atténuée *Scævola attenuata* robert Brown.

Racines fibreuses, vivaces.
Tiges herbacées, dressées, simples, glabres, de 30 centimètres.
Feuilles alternes, embrassantes, lancéolées, glabres.
Ombellules axillaires et terminales, ramassées, à pédicelles glabres.
Calice glabre, Pétales rose violacé.

Orangerie Terre légère, mi-soleil, eau modérée, de boutures et d'éclats. Caroline.

Ephémère à fleurs roses Tradescantia rosea Michaux du Museum.

Lith. Pelletier pass. du caire 36

Tiges ligneuses à la base, presque simples, de 80 centimètres, poilue.
Feuilles opposées, linéaires, glabres, à bords un peu roulés
Ombellules terminales et quelquefois axillaires, d'une vingtaine de fleurs.
Sépales pointus. Pétales blancs tachés de rouge brun.

Orangerie, Terre de Bruyères, soleil, eau assez abondante. Déclats, de boutures de Mexico.

Asclépiade à feuilles de lin Asclépias linifolia Lagasca

Lin pollenis pass du caire 36

Tige ligneuse, dressée, rameuse, rougeâtre, d'1 mètre.
Feuilles verticillées par 4 à 6, linéaires ouvertes, raides, ciliées, à bords roulés en dessous.
Ombellule terminale en tête de fleurs nombreuses, penchées
Corolle en tube resserré vers le bord, rouge. Anthères mutiques, incluses. Ovaire velu.

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de marcottes et de boutures. Cap de Bonne Espér.
Bruyère cerinthoïde. Erica cerinthoïdes Linné

Racine bisannuelle
Tige herbacée, dressée, rameuse, d'1 mètre, cylindrique
Feuilles opposées, décussées, embrassantes, en cœur long, nervées
Pédoncules axillaires et terminaux, trifides, Bractées calicinales très grandes, en cœur
Calice visqueux, Corolle en entonnoir ouvert, beau jaune

Orangerie, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de Graines. Iles Canaries.

hippion visqueux Gentiana viscosa Piton

Lith. pelletier pas. du caire 36

Tige ligneuse dressée, rameuse, d'1 mètre, rouge ou jaune.
Feuilles opposées, pétiolées, elliptiques, obtuses, lisses.
Pédoncules axillaires, solitaires, opposés, courts.
Calice à lobes étroits, Corolle rose ou blanche, à cœur rouge ou vert.

Serre tempérée, bonne terre franche, soleil eau modérée, de graines de boutures asie équinoxiale

Pervenche du cap Vinca rosea Linnée

Lith. Pesletier pas. du Caire 36.

Racine rameuse
Tige formée par les gaines des feuilles.
Feuilles radicales, s'engainant dans leurs longs pétioles, en cœur très aigu, vert gai.
hampe centrale unique, d'1 mètre, terminée par une spathe en cornet blanche, d'odeur agréable.
Spadice à étamines nombreuses, jaunes, ovaires verts à stigmate brun.

Serre tempérée, terre de bruyères, soleil, beaucoup d'eau l'été. de rejetons. Afrique australe.

Pied-de-veau Calla æthiopica Linnée

Lith. Pelletier pas. du caire 55



Tige très courte, charnue, en souche
Feuilles sur 2 rangs, sessiles en langue, verrueuses, à bords minces, comme denticulés.
hampe centrale de 50 centimètres, terminée par une grappe de 20 à 30 fleurs pendantes.
Corolle arquée, rouge à la base, verte au sommet.

Orangerie, Terre sableuse, Soleil, peu d'eau. de rejetons Cap de Bonne espérance.

Aloës langue-de-chat Aloë lingua willdenow.

Lith pelletier pass du caire 56

Tige ligneuse, courte, grosse, peu ou point [illegible], dressée.
Feuilles éparses, pétiolées, elliptiques, entières, ondulées, glabres, de 30 centimètres de long
Pédoncule d'1 mètre, terminé par une énorme panicule à rameaux applatis.
Calice beau violet, Pétales à peine saillants, blanchâtres.

Serre tempérée, Terre franche légère, Soleil, eau modérée, d'Eclats, de Boutures.

Statice en arbre — Statice arborea

Lith. Pellier à St Lô

Chez Chauvin rue de la Roquette 106

Tige ligneuse, branchue, de [illegible] pieds. [illegible] nombreux, lisses.
Feuilles alternes, [illegible] entières, glabres, souvent [illegible].
Grappes axillaires, [illegible]
Pétales blancs [illegible] de rose au [illegible]
Baies rouge vif, [illegible]
[illegible] des Indes occid.

Rivine lisse — [illegible] laevis Lamarck

[illegible] [illegible] rue de la Roquette 104

Tige ligneuse à la base, à rameaux nombreux, herissés, velus, [illegible]
Feuilles opposées, très petites, peu petiolées, arrondies, crenelées, glanduleuses
Grappes terminales de peu de fleurs
Calice à lèvre inférieure double de la supre. Corolle violette.

Serre tempérée. Terre franche et de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de Boutures sous chassis. Nlle Holl.

Prostanthère violette Prostanthera violacea R. Brown

Lith. Letellier à S. Leu. Chez les frères Cels chaussée du maine 77

Tige ligneuse à la base, volubile, grêle, peu rameuse, de 2 mètres, rameaux poilus.
Feuilles opposées, pétiolées, en cœur, aiguës, molles, un peu poilues
Ombellules axillaires, solitaires, pédonculées, pendantes, de 6 à 10 fleurs
Corolle chamois, rayée et ponctuée de pourpre en dedans, velue en dehors

Serre tempérée. Terre de Bruyère. Soleil. beaucoup d'eau l'été. de Boutures. Buenos-Ayres

Philibertie à grandes fleurs. Philibertia gracilis Sweet

Lith. [illegible] à St Leu

Chez Chauvière rue de la Roquette 104

Tige ligneuse, dressée [illegible] poilue glanduleuse
Feuilles verticillées [illegible] oblongues, obtuses, couvertes de poils glanduleux
Grappes [illegible] terminales. Bractées éloignées des fleurs.
Corolle [illegible] godet, velue-visqueuse, blanche. Anthères incluses (aristées [illegible]) ovaire [illegible]

[illegible] Terre de Bruyères, mi-soleil, eau moderée. de Boutures Nouvelle hollande
Bruyère [illegible] Erica pannosa Salisbury
[illegible]

Chez les frères Cels, Chaussée du Maine 77

Tige ligneuse, dressée, rameuse, un peu velue, de 60 centimètres
Feuilles ternées, linéaires, obtuses, très ouvertes, pubescentes.
Fleurs terminales ternées, pédonculées. Calyces foliacés poilu.
Corolle en tube évasé, écarlate, à limbe jaunâtre. Anthères presqu'incluses aristées

Serre tempérée, Terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de Marcottes et de Boutures. Cap de B. Espéran.
Bruyère à côtes Erica costata hortulanorum. an Andrews?
Lith. Letellier à St Leu.
Chez Martine rue des Bourguignons 27

Tige ligneuse à la base, redressée, rameuse, anguleuse, de 10 centimètres
Feuilles alternes, pétiolées en bas, presqu'en cœur aiguës, à dents grosses inégales.
Pédoncules en grappe terminale, très longs, de l'aisselle de bractées linéaires
Corolle plus que double du calyce, bleu clair, à 3 lobes inférieurs maculés de foncé

Terre tempérée, terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée. de Graines de Boutures. Cap de B. Espér.

Lobélie à feuilles en coin Lobelia cuneifolia Linn.

Lith. Letellier à St Lou

Chez Pelé rue de l'Oursine 71

Tige ligneuse, dressée, rameuse, blanche, un peu cotonneuse, de 60 centimètres
Feuilles écartées, très petites, en forme de [illegible], vertes.
Fleurs terminales solitaires, presque sessiles.
Calyce commun écailleux rouge, corolles blanc sale

Serre tempérée, Terre légère, soleil, eau modérée, [illegible] Afrique méridionale
Phænocome prolifère Elichrysum proliferum Willd.

Lith. Lechner à St Leu
Chez [illegible] Boul. des Gobelins [illegible]

Tige ligneuse, dressée, rameuse, d'1 mètre, glabre.
Feuilles opposées, de 3 à 7 folioles elliptiques lancéolées, à pétiole ailé
Pédoncules axillaires, solitaires, simples; 2 Bractées vers son milieu.
Corolle rose, disque volumineux. Filets à glande verte.

Orangerie. Terre de Bruyères, mi-soleil, peu d'eau. de Boutures. Nouvelle hollande
Boronie ailée Boronia alata Smith

Lith. Letellier à St Lou. Chez les frères Cels chaussée du maine 77

Racine vivace. Tige redressée herbacée rameuse, arrondie, pubescente
Feuilles opposées lancéolées, à peine velues.
Pédoncules terminaux simples presque toujours solitaires, munis de bractées.
Calyce cylindrique à côtes. Pétales à 4 dents, écarlates.

Serre tempérée, Terre légère, Soleil, eau modérée. de graines et d'éclats De Mexico.

Silène déchiquetée Silène laciniata Cavanilles

Lith. Letellier à St Leu Chez Pelé rue de l'oursine 71

Racine vivace. Tige herbacée, dressée, rameuse, comprimée; de 20 centimètres
Feuilles linéaires, pointues, longues
Ombellule terminale, sessile; entourée d'une spathe ou collerette de 3 bractées courtes
Fleurs jaunes.

Serre fr... Terre franche légère, mi soleil eau modérée. De graines et d'éclats. Cap de Bonne esper.

Bermudienne roulée Sisyrinchium convolutum Nees

Lith. Lebellier à l'Em.　　　　Chez Pelé rue de l'ouest(?) 71

Tige ligneuse à la base redressée à rameaux anguleux velus
Feuilles alternes de 11 à 13 folioles en coin.
Ombellules axillaires pédonculées, de 6 à 8 fleurs.
Pétales roses
Légumes articulés arrondis, droits
[illegible] Crète
Coronille de crète   Coronilla cretica Linné

Tige ligneuse, dressée d'1 mètre ½, à rameaux formant un tête
Feuilles opposées, à peine pétiolées, ovales-lancéolées, pointues, glabres, persistantes.
Pédoncules axillaires simples solitaires ou géminés, longs
Calyce à 5 dents. 5 ou grand nombre de pétales blancs.
Baie arrondie ou cylindrique, verdâtre ou noirâtre
Orangerie, Terre franche, Soleil, beaucoup d'eau. de graines, de marcottes de boutures. d'Asie et d'Afrique

Myrte Myrtus communis Linnée

Lith. Letellier & Stein.

Tige ligneuse à la base, dressée, rameuse, de 60 centimètres
Feuilles opposées, pétiolées, en cœur, larges, aigues.
Pédoncules entre les 2 pétioles, alternes, solitaires, simples. 2 petites bractées
Calyce velu, jaune, orangé à la base. 2 pétales noirâtres.

Serre tempérée, terre franche, mi-soleil, eau modérée. de graines de boutures

Cuphée à fleurs poilues Cuphea pubiflora

Lith. Letellier à St Leu

du museum

Tige ligneuse, dressée, rameuse, de plusieurs mètres
Feuilles alternes, à court pétiole, lancéolées, dentées, luisantes
Panicule terminale à pédoncules glabres.
Pétales lancéolés plus longs que le calyce. Etamines exsertes.

Orangerie. Terre légère ; Soleil, eau modérée. de boutures sur couche. Indes orientales.
Raphiolepis de l'inde   Cratægus indica. Linnée (ex Spr. nec Don)

Lith. Letellier à S.t Leu

Racine vivace, tige herbacée, rameuse, faible, dressée, de 60 centimètres
Feuilles alternes de 5 digitations elliptiques à grosses dents, poilues.
Panicule terminale trichotome, le pédicelle médian simple, uniflore.
Pétales jaune carné, bordés de rose, onglet rouge vif.

Sans froide, terre de Bruyères, mi-soleil, eau modérée, de graines et d'éclats

Potentille de hopwood Potentilla hopwoodiana

Tige ligneuse, dressée, rameuse, de 2 mètres. Rameaux un peu visqueux.
Feuilles (Pétioles) alternes, en demi-lance ondulées, pointues. 2 épines à chaque aisselle.
Pétioles axillaires, solitaires, terminés par une tête de fleurs nombreuses, serrées.
Fleurs jaunes

Orangerie, Terre franche légère, mi-soleil, eau modérée. De Graines et de Boutures. Nouvelle hollande

Acacia ondulée Mimosa paradoxa.

Lith. Letellier à St Leu

Tige ligneuse, dressée, très rameuse
Feuilles alternes, de 3 folioles en coin, pointues, roides, recourbées, pointe en épine
Fleurs axillaires, pédonculées, ramassées vers le haut des rameaux
Calice gonflé. Pétales d'un bleu violacé au bord, blanchâtres vers leur base.

Orangerie Terre franche légère. Soleil ou modérés de graines sur couche Afrique méridionale

Psoralée épineuse *Psoralea aculeata* Linné

Lith. Letellier à St. Lou.

Tige ligneuse, dressée, rameuse, glabre d'1 mètre
Feuilles alternes de 11 folioles oblongues pointues, poilues dessous. Stipules ovales
Grappes terminales de peu de fleurs
Corolle rose pourpré
Legume, [illegible]
Serre tempérée; Terre légère, mi-soleil, eau modérée. De graines, de boutures   *Cap de bonne espérance*

Téphrosie à grandes fleurs   Galega rosea Lamarck.

Pr. Pelletier à [illegible]

Tige ligneuse, dressée, rameuse de 2 mètres, glabre.
Feuilles éparses, à court pétiole, obovales coriaces, obtuses entières, ondulées.
Pédoncules axillaires, à peu de fleurs
Calyce à sépales un peu obtus, velus. Pétales 5 rchâtres

Orangerie. Terre franche légère. Soleil, eau modérée. De marcottes incisées. De Madère.

Pittospore à feuilles épaisses Pittosporum coriaceum Vitm.

Lis Pittos à 1 Leu

Tige ligneuse, droite de la [illegible]. Rameaux nombreux [illegible]
Feuilles éparses à peine pétiolées, lancéolées [illegible]
Fleurs en têtes terminales petites
Corolle blanche, velue

[illegible] de Bruyères [illegible]
Bruyère du cap Phylica [illegible]

Lith. Letellier [illegible]

Tige [illegible] ligneuse tuberculeuse et longues épines [illegible] rameaux à 4 ans [illegible]
2. Feuilles alternes, [illegible] à pointe [illegible]
3. Pédoncules axillaires, [illegible] ou plus [illegible]
Collerette de 2 feuilles planes [illegible] [illegible] [illegible]

Serre tempérée, Terre de Bruyère. Soleil [illegible] [illegible]
Euphorbe de brune Euphorbia [illegible]
Par Petellier à [illegible]

Tige ligneuse, grimpante, très rameuse, grêle, glabre, de plusieurs mètres.
Feuilles alternes, pétiolées, à 5 palmures, très entières, 4 glandes au pétiole.
Pédoncules axillaires, solitaires, uniflores. Collerette de 3 folioles ovales entières
Couronne plus courte [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] blancs.

[illegible] terre de Serre tempérée, Terre légère, Soleil, eau modérée, de Marcottes et boutures. du Brésil.

Grenadille bleue Passiflora cœrulea Linnée

[illegible]

Genres. **Lachenalia** Jacq (famille des liliacées)

Perianthe de 3 divisions externes (calice ?) obtuses
et 3 divisions internes (corolle ?) plus longues
6 Etamines à filets droit, anthères ovales à 2 loges
1 ovaire supère à 3 arêtes, 1 style en alène, stigmate simple
Capsule ovale à 3 arêtes 3 ailes 3 loges, placenta central

Lechenaultia R. Brown (famille des Lobéliées)

Calice à 5 dents
Corolle monopétale irrégulière fendue, à 2 dents pointues droites, 3 obtuses réfléchies
5 Etamines à filets libres anthères longues à 2 loges et conniventes
1 Ovaire infère, 1 style, stigmate au fond d'un entonnoir à 2 lèvres
capsule en prisme, à 4 valves, dont 2 opposées portent la cloison au milieu
Graines nombreuses très petites

Mimulus Linnée (famille des Scrofulariées)

Calice à 5 dents
Corolle à 2 lèvres la supérieure échancrée l'inférieure à 3 divisions égales
4 étamines dont 2 plus longues, anthères en rein
1 ovaire supère, 1 style, stigmate bifide
Capsule ovale à 2 loges, 2 valves, cloison placentaire perpendiculaire aux valves
Graines nombreuses petites

Maurandia Ortega (famille des Scrofulariées)

Calice à 5 segments en quinconce
Corolle bossue à la base, à 2 lèvres la Sup^re échancrée, l'Inf^re à 3 dents rondes
4 étamines dont 2 plus longues, filets dilatés poilus à la base, anthères oblongues
1 ovaire supère ovoïde, 1 style en alène, stigmate échancré
Capsule à 2 loges s'ouvrant par 10 dents au sommet
Graines ovales, nombreuses, noires, tuberculeuses

Chorizema Labillardière (famille des Légumineuses)

Calice à 2 lèvres, la supérieure à 2, l'inférieure à 3 dents
Corolle papillonacée à carène ventrue plus courte que les ailes
10 Etamines à filets libres anthères à 2 loges
1 ovaire supère, style crochu, stigmate oblique obtus
légume ventru à plusieurs graines
Graines réniformes, sans périsperme.

N^ta dans le feuillet de texte du 1er cahier ligne 3 lisez: succulence.
pl. 9 lisez: calice très velu égalant la corolle pubescente en cloche

Lith. Desaillot Llopis et Cie rue des arcis 17

On appelle, Espèce l'ensemble des plantes qui, provenues des mêmes graines, se ressemblent par la forme de toutes leurs parties mais peuvent différer par la grandeur, par le plus ou le moins de vivacité de vélu de spinosité, par la couleur l'odeur ou la saveur de leurs diverses parties.
ces différences, peu importantes pour le botaniste et dépendant du climat ou du sol, forment les Variétés
Les altérations accidentelles de forme, les soudures, dédoublements ou transformations d'organes sont des Monstruosités (fleurs doubles, prolifères &c) les individus qui en sont affectés ne donnent presque jamais de bonnes graines
Hybrides les individus qui tenant le milieu entre deux espèces proviennent ou sont supposés provenir de la fécondation des graines de l'une par le pollen de l'autre
Genre la réunion des espèces qui se ressemblent par la forme de la fleur et du fruit mais qui peuvent différer par tout le reste
le genre peut n'avoir qu'une espèce ou en contenir 2, ou plus (jusqu'à plus de 600)
Famille l'ensemble des genres qui ont de l'analogie par les caractères essentiels de la fleur et du fruit, elle contient toujours plusieurs genres
Classe la réunion de genres ou de familles en groupes que offrent des caractères plus ou moins arbitraires. Les classes ainsi que les subdivisions intermédiaires à toutes les précédentes n'ont été imaginées que pour faciliter la recherche des noms, et elles ont varié selon chaque botanistes
Les botanistes systématistes n'admettent pas de familles
les méthodistes ne devraient pas avoir de classes.
Depuis Linnée les plantes portent 2 noms. le 1er est celui du genre il est substantif. le second est celui de l'espèce (il est complémentaire et devrait être toujours adjectif et simple (exemple, Jasminum revolutum) quand on veut désigner la variété on y ajoute un 2me adjectif (erica pursoluta alba). Ce serait une idée admirable si les plantes ne changeaient jamais de genre, mais soit par nécessité soit par caprice les botanistes les ballotent souvent, alors il faut changer le 1er mot et si le genre dans lequel on les place contient une espèce du même nom il faut changer leurs deux noms ce qui joint aux erreurs fait que telle plante porte 6 noms différents tandisque tel nom est appliqué à 6 plantes fort distinctes les unes des autres. de là une confusion déplorable, et cependant il est indispensable de savoir le nom des plantes comme nous le dirons.
Dans les cahiers suivants nous donnerons les caractères des genres dans un 26me feuillet

Lith de Desaillet Llopis et Cie rue des arcis 17

Angelonia humboldt (Famille des Scrofulariées)

Calice à 5 divisions
Corolle irrégulière à gorge en voute, lèvre inf^re à 3 divisions dont la moyenne en sac
4 étamines dont 2 plus longues, (didynames) anthères à loges écartées
1 Ovaire supère, 1 style, stigmate simple
1 Capsule ovale à 2 valves fendues, 2 loges, plusieurs graines

Billardiera Smith (famille des pittosporées)

Calice à 5 divisions colorié
5 Pétales concaves rapprochés
5 étamines hypogynes
1 ovaire supère 1 style, stigmate à 2 lobes
Baie à 2 loges polyspermes

Swainsonia salisbury (famille des legumineuses)

Calice à 5 dents
Corolle papillonacée, étendard à 2 callosités à la base
10 Etamines dont 9 filets soudés en un seul, et 1 isolé (diadelphes)
1 Ovaire supère, style barbu longitudinalement, stigmate terminal
Légume gonflé mais pas boursouflé a 1 loge et plusieurs graines

Leycesteria wallich (famille des Rubiacées)

Calice à 5 dents inégales
Corolle monopétale en entonnoir, bossue près la base, à 5 lobes
5 Etamines égales, anthères à 2 loges
1 Ovaire soudé au calice (infère) 1 style, stigmate en tête
Baie à 5 loges polyspermes

Eccremocarpus ruiz et Pavon (famille des Bignoniées)

Calice à 4 ou 5 lobes, grand lâche.
Corolle en tube, bord renversé en dehors à 5 divisions
4 Etamines dont 2 plus longues, un 5me filet sans anthère
1 Ovaire non adhérent au calice (supère) 1 Style, stigmate à 2 lames
Capsule ovale à 1 loge, Graines attachées aux valves, entourées d'une aile.

Daviesia r. Brown (famille des legumineuses)

Calice à 5 dents, sans bractées
Corolle papillonacée, à carène très petite
10 Etamines à filets libres
Légume comprimé anguleux, s'ouvrant avec élasticité, à 1 graine

Lith. de Desaillet R des arcis 17

N.ta Le nom d'Erica depressa ayant déjà été donné à 2 autres erica, j'ai un peu changé ce nom à la pl. 83 ce que je ferai en toute circonstance pareille pour debrouiller le chaos de la synonymie

---

Les auteurs sont si peu d'accord sur la signification des noms destinés à caractériser l'Inflorescence, ou manière dont les fleurs sont disposées sur la plante que nous allons nous en occuper

Les fleurs sont attachées 1° ou à une tige bien visible et on les dit caulinaires 2° ou à une tige si courte (Rhizome) qu'on les croirait sorties de la racine ou Radicales.

Elles sont insérées 1° par un filet ou support bien visible appelé Pédoncule (je préfère le nom de Pédoncelle réservant le 1er à la réunion de 2 ou plusieurs supports en un seul) 2° immédiatement ou par un support si court qu'on ne le voit pas, on les dit Pédonculées dans le 1er cas, Sessiles dans le 2me

Elles peuvent être Solitaires c'est à dire isolées les unes des autres, et Eparses c'est à dire sans ordre, ou alternes c'est à dire de deux cotés de la tige mais pas à la même hauteur ou opposées c'est à dire de deux cotés de la tige et à la même hauteur ou Décussées quand les fleurs sont opposées alternativement sur 2 faces puis sur 2 autres





Ternées, Quaternées quand elles sont par 3 ou par 4 à la même hauteur et autour de la tige



Verticillées quand elles sont en plus grand nombre et en anneau autour de la tige

Semi verticillées si elles ne font que demi-anneau



Bijuguées ou Trijuguées si elles sortent 2 ou 3 du même point —



L'Ensemble de plusieurs fleurs s'appelle

Epi quand les fleurs sont insérées isolément (soit sessiles soit pédonculées) sur un pédoncule commun formant axe et ne portant pas de vraies feuilles.



L'épi est quelquefois rameux c'est à dire divisé en branches

Ombellule quand les fleurs partent d'un même point pour s'écarter comme les branches d'un parasol



Ombelle si le point de départ de plusieurs ombellules est le sommet de pédoncules se réunissant tous sur un seul point de la tige (les petites feuilles ou bractées qui s'attachent souvent à la base de l'ombelle se nomment Involucre, celles de l'ombellule Involucelle)

Tête quand les fleurs sessiles sont disposées tout autour d'un renflement formé par l'extrémité du pédoncule (une tête de fleurs pedoncellées n'est qu'une ombellule trop étalée)

Lith. Desaillet R. des arcis 17

2° Les étamines presque toujours placées autour du pistil visible ou avorté, sont formées d'une masse creusée (anthère) d'une, beaucoup plus souvent de deux, fort rarement de quatre cavités ou loges qui renferment une quantité considérable de grains appelés Pollen. Les loges (ou Thécas) sont ou appliquées immédiatement l'une à l'autre ou réunies à l'aide d'un corps intermédiaire nommé connectif. quelquefois elles se prolongent en arête et on les dit aristées, on les dit mutiques dans le cas contraire et le plus fréquent. pour laisser sortir le pollen, les loges s'ouvrent tantôt par un pore au sommet, tantôt par une fente transversale, le plus souvent par une fente longitudinale. Le pollen formé de grains polliniques presque toujours sphériques, (si petits qu'il faut au moins une loupe pour les distinguer, en s'échappant des loges de l'anthère, tombe sur les stigmates, ses grains se déchirent, et laissent échapper un liqueur huileuse, aura seminalis, que les stigmates doivent pomper et porter aux ovules pour que ceux-ci se développent en graines, sans quoi ils se fanent et la fleur est stérile.

Si les anthères sont si près les unes des autres qu'elles se touchent par leurs bords en formant cercle autour du pistil, on les dit connées. Si ces bords sont soudés ensemble les anthères et même la fleur prennent l'épithète de Syngénèses, la fleur ou la plante est Synanthérée les anthères sont attachées à la fleur (au pistil ou aux parties accessoires) soit immédiatement et on les dit sessiles, soit le plus souvent par l'intermédiaire de filets auxquels elles s'insèrent par leur base et on les dit terminales, ou par leur côté et on les dit latérales. Il y a ordinairement autant de filets que d'anthères et les étamines se disent libres, mais quelquefois ces filets se soudent ensemble soit en un seul corps et les étamines ou la fleur sont dites Monadelphes, soit en deux corps contenant nombre égal ou inégal de filets (souvent 9 pour un corps et un seul pour l'autre) étamines ou fleurs Diadelphes, soit en plusieurs corps, étamines ou fleurs Polyadelphes

Les filets sont attachés par leur base soit au dessous de la base de l'ovaire qui doit alors être supère, et on les appelle hypogynes soit au niveau du pourtour de l'ovaire qui peut être supère ou infère étamines périgynes ; soit sur l'ovaire lui même qui ne peut être qu'infère, étamines épigynes, et la fleur s'appelle gynandre.

Les fleurs se nomment monandres, diandres, triandres, tétrandres, pentandres, hexandres heptandres, octandres, ennéandres, décandres, dodécandres, polyandres selon qu'elles offrent 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ou plus d'étamines égales, didynames si elle a 4 étamines dont 2 plus longues, tétradynames si elle en a 6, dont 4 plus longues

monogynes, digynes, trigynes, tétragynes, pentagynes, polygynes si elles ont 1,2,3,4,5 ou plus de styles

Dichotomie quand les pédoncules se divisent en 2 branches qui se partagent en 2 rameaux
séparés en 2 ramilles et ainsi de suite 
Trichotomie si les mêmes divisions ont lieu 3 par 3
Cyme lorsque 3 pédoncules, au moins, partant du même point comme dans
l'ombelle, se divisent irrégulièrement en pédoncelles
Panicule si les pédoncules partant de divers points d'un axe, se ramifient
irrégulièrement
La panicule prend, selon sa forme, des noms différents qu'on devrait supprimer parceque ils
ont souvent été appliqués à d'autres inflorescences, et parceque le mode d'insertion doit seul
servir à classer celles-ci. ainsi :
Le corymbe n'est qu'une panicule applatie verticalement, (déprimée)
et imitant l'ombelle
Le Thyrse est une panicule conique et dressée
La Grappe est une panicule conique et penchée ou un Epi de fleurs pédoncellées
La Crête, panicule applatie latéralement (comprimée) ou Epi à fleurs tournées toutes
du même côté
La Queue, panicule cylindrique serrée (Dense) ou épi de même forme
Il y a une autre espèce de Panicule formée de demi-verticilles alternes
de pédoncules irrégulièrement ramifiés, oserai-je la nommer Vertipanicule ?
Le Chaton est un épi dont les fleurs ne sont formées que d'une écaille
portant les étamines et ou les pistils
Le Cône est le même épi dont les écailles s'épaississent au sommet pour
former une masse conique
L'épillet est la réunion de 2 ou plusieurs fleurs formées de 2 écailles (Bâles)
renfermant les étamines et le pistil, ramassées en épi très court, et enveloppé
à la base par 2 (quelquefois 1) écailles (Glumes)
Le Receptacle est un épaississement du sommet du pedoncule, sur le quel
s'insèrent plusieurs fleurs sessiles (ou une tête) enveloppées en masse par des
écailles (calice commun ou Anthodie). Si ce receptacle se recourbe par dessus
les fleurs pour les renfermer comme dans une poche sans ouverture c'est une figue.
Le spadice est un épi dont l'axe ne porte que des étamines et ou des pistils
S'il est enveloppé dans une espèce de feuille roulée, on appelle celle-ci Spathe
On voit que toutes ces expressions depuis corymbe pourraient être supprimées
si les fleurs sont toutes inserées du même coté de leur support commun on les
nomme en latin secundæ il nous faudrait un mot en français 
on les appelle distiques si elles sont insérées sur 2 rangs opposés

Lith Desaillet R des arcis 7

Quelques souscripteurs ayant désiré des noms français, je vais indiquer les noms botaniques des espèces publiées, en attendant que les amateurs soient convaincus qu'un seul mot vulgaire comme Gyroselle, en permettant de balloter de genre en genre, sans changer de nom, serait préférable à vingt synonimes pour la même plante

1 Clématite aérée
2 Pimélée remarquable
3 Capucine tricolore
4 Cestreau rose
5 Labichée ponctuée
6 habrothamne élégant
7 Chorizème varié
8 Polygala de dalmais
9 Bruyère bruniade
10 Lovée de cels
11 Mimule cardinale
12 Ciste crépu
13 Pardanthe
15 Maurandie de barclay
16 Jasmin des açores
17 Lachenale à fleurs jaunes
18 Amaryllis à longues feuilles
19 Myopore à petites feuilles
20 Verveine de miquelon
21 Calceolaire à deux couleurs
22 Sauge écarlate
23 Stœchas
24 Datura sanguin
25 Morelle poilue
26 Lechenaultie offerte
27 Campanule grêle
28 Bruyère douteuse
29 Chænostome à plusieurs fleurs
30 habrothamne en faisceaux
31 Mauve couleur de brique
32 Polygala à feuilles en cœur
33 Pultenée à calice soyeux
34 Clematite à deux couleurs
35 Oxalide de deppei
36 Waltonie à grandes fleurs
37 Sauge ouverte
38 Fuchsie grêle
39 Lachenale tricolore
40 hémitome à feuilles d'ortie
41 Tritome moyen
42 Stachys écarlate
43 Tabac glauque
45 Siphocampyle à 2 couleurs
46 Trachélie bleue
47 Cléthra de madère
49 Asclepiade à feuilles de saule
50 Pentstemon délicat.
51 Achymène à longues fleurs
52 Cuphée vermillon
53 Angélone remarquable
54 Sipanée couleur de chair
55 Billardière à feuilles de saule
56 Kennédie écarlate
57 Swainsonie pourpre
58 hydrangée du japon
59 Daviésie à feuilles en lance
60 Myrte à feuilles étroites
61 Leycestérie belle
62 Bouvardie à trois feuilles
63 Verveine à feuilles de germandrée
64 Fuchsie à Corymbes
66 Eccremocarpe rude
67 Cinéraire maritime
69 Glayeul fleurissant
71 Dianelle bleue
72 Aloës verruqueux
73 Stapélie panachée
74 Astère musquée
75 Pentstemon en forme de gentiane
76 Abutilon veiné
77 Isotome à fleurs axillaires
78 Polygala à feuilles de laurier
79 Statice duveteuse
80 Carmantine carnée
81 Millepertuis du népaul
82 Hoitzie écarlate
83 Bruyère abaissée
84 Amphicome délicate
85 Diosma à feuilles de bruyère
86 Gazanie à grandes fleurs
87 Scille du pérou
89 Tagetès luisant
91 Stevia pourpre
94 Cierge sillonné
95 Lechenaultie belle
97 Phlox tout fleuri
98 Lobelie brillante
99 Galane barbue
100 Eupatoire rugueuse
101 Jasenie frangée
102 Achimène à grandes fleurs
103 Statice à feuilles minces
104 Cléome épineuse
105 Angelone à grandes fleurs
106 Cuphée élancée
107 Dioclée en forme de glycine
108 Nierembergie intermédiaire
109 Tournefortie en héliotrope
110 Sélagine de gilles
111 Bruyère méditerranée
112 Lobélie sy
113 Velthémie du cap
114 Morelle à feuilles glauques
115 Aloës nain
116 héliotrope à grandes fleurs

La Fleur est la partie d'une plante destinée à reproduire des individus semblables à elle au moyen de graines ou embryons fécondés.
Elle se compose de parties essentielles, (Pistils et étamines) et de parties accessoires (Corolle, Calice, Nectaires, Staminules &c &c
Le Pistil est formé de l'Ovaire, organe placé presque toujours au centre de la fleur, et renfermant les graines qui dans leur enfance prennent le nom d'ovules. Cet ovaire est attaché soit immédiatement à la base de la fleur, soit par l'intermédiaire d'une masse vasculaire et charnue appelée disque rarement par un long support nommé pédicule

Il est surmonté d'un ou plusieurs filets appelés styles qui se terminent en haut chacun par 1 ou plusieurs fils ou masses plus ou moins glanduleux souvent creusés d'un tuyau et appelés stigmates, ceux-ci sont destinés à absorber et à porter à travers le style jusque dans l'ovaire, la matière fécondante du pollen sans la quelle les ovules se flétriraient au lieu de mûrir



quelquefois les stigmates s'insèrent directement à l'ovaire sans style, et on les dit sessiles

leur forme varie beaucoup. Tantôt comme des fils filiformes tantôt comme une tête quelquefois applatis en crête ou en pétale pétaliformes ou en 2 lèvres ailleurs creusés en entonnoir ou infundibuliformes &c ils peuvent être simples, bifides, trifides
L'ovaire est adhérent 1° tantôt par sa base seule à la base de la fleur et on le dit supère ou libre, 2° tantôt en outre par un peu moins de moitié de la hauteur de son pourtour aux enveloppes de la fleur (semi-supère) 3° ou par un peu plus de la moitié de cette hauteur (semi-infère ou par tout son pourtour et alors on le dit adhérent ou infère
Il peut être simple ou multiple c'est à dire formé de plusieurs ovaires accolés les uns aux autres
Il est creusé, pour contenir les ovules, d'une ou de plusieurs cavités qu'on nomme loges et on le dit uniloculaire dans le 1er cas, bi, tri, quadri, quinque-loculaire s'il a 2,3,4,5 loges multiloculaire s'il en a davantage
Les lames membraneuses ou charnues qui séparent les loges s'appellent Cloisons elles sont presque toujours longitudinales c'est à dire qu'elles vont de la base au sommet de l'ovaire, et s'il n'y en a qu'une elle se dirige d'un coté à l'autre de la fleur, très rarement les cloisons sont transversales

Lith Desaillet R des arcis 17

Faubourg St martin 108, chez Meilhac Poitre St Benoît 14 et Bossin quai aux fleurs 5

Flore Universelle. 1° d'Orangerie, de Serres froide et tempérée par Letellier

D.m.p. ex voyageur-naturaliste du Museum, auteur de plusieurs ouvrages sur les champignons &c &c

un cahier de 25 figures in 4° avec descriptions, cultures &c par mois. un noir 1f 25 Colorié 2f 50c
Chaque feuille séparée noire 5 centimes, coloriée 15 centimes

---

Que de fois n'avons nous pas entendu déplorer, depuis 30 ans, qu'il n'y eut pas un ouvrage à bas prix, mais exact, dans lequel les vrais amateurs, les élèves les jardiniers pussent apprendre à connaître toutes les plantes dont ils s'occupent, autant par leurs caractères botaniques (si négligés dans toutes les nouvelles publications) que par leur aspect et leur port, sans être forcés d'acheter pour 30 ou 40,000 francs d'ouvrages. Puisque personne ne s'est senti le courage d'entreprendre cet immense travail, j'en ai tenté la publication dès que ma position me l'a permis, et je n'ai qu'à m'en louer. A peine y a t-il quelques mois que j'ai commencé, et déjà mes frais sont couverts (c'était ma seule ambition) grâce à l'appui bienveillant que m'ont prêté mes honorables clients qui connaissaient mon zèle désintéressé. Je leur offre les témoignages de ma reconnaissance en attendant que je publie leurs noms. Les matériaux, que j'ai amassés, sont immenses, et les principaux floriculteurs me communiquent leurs richesses avec un empressement dont je les remercie; j'espere que leurs confrères comprendront l'importance de mon travail pour le commerce des fleurs et pour leurs intérêts particuliers. Le museum m'est ouvert moins par mes anciennes fonctions dans cet admirable établissement que par l'extrême bienveillance de ses membres. Je n'ai donc qu'à prier le public de me continuer sa faveur, et qu'à profiter des bons avis qu'on daignera me donner; car plus j'aurai de bénéfices, plus je ferai de sacrifices pour améliorer mon travail, et le rendre universel en publiant, en même temps que mes cahiers d'orangerie, des cahiers 1° de plantes utiles et dangereuses, 2° de fleurs de pleine terre, 3° de flores locales, 4° de cryptogames. &c

L'offre que nous faisons de vendre les feuilles détachées donne aux personnes qui possèdent déjà d'autres ouvrages, la faculté de les compléter sans avoir des doubles. Les ouvrages français qui contiennent le plus de figures, n'en donnent que 48 par année, et coutent 24 francs. il leur faudra plus de 100 ans seulement pour les plantes d'agrément! pour le même prix nous donnons 240 planches en 10 mois ou en 6 fois moins de temps, et si le public nous aide nous pourrons en publier 1500 par année!

Il suffira aux habitants de paris ou de la vallée de Montmorency, qui désireraient recevoir notre ouvrage franc de port et à mesure de sa publication, de nous adresser un mot par la poste (à Mr Letellier Docteur et propriétaire à St Leu-taverny Seine et oise). les habitants de la province qui desireront jouir de la même faveur devront nous adresser un mandat sur la poste de 10 francs par 4 cahiers ou par 80 feuilles détachées à leur choix. (Il y a 8 cahiers ou 200 feuilles de publiés)

Lith. Desaillet R des arcis 17.

Entre les diverses étamines, ou entre elles et le pistil, ou entre elles et les enveloppes de la fleur, on rencontre quelquefois des filets de formes variables, mais sans anthères et que l'on nomme Staminules ou Staminodes leur usage est ignoré; ils paraissent être souvent des étamines avortées.

Dans d'autres plantes on trouve aux mêmes places des masses allongées destinées à secréter une humeur sucrée, on les appelle nectaires

Les fleurs qui présentent un ou plusieurs ovaires entourés d'une ou de plusieurs étamines s'appellent fleurs hermaphrodites

celles qui ne renferment que des pistils Fleurs femelles

et celles qui n'ont que des étamines Fleurs mâles souvent alors les étamines sont rangées en cercle autour du point central que devrait occuper le pistil s'il n'était pas avorté. (Les pistils et les étamines s'appellent organes sexuels)

Les pieds de plantes qui ne portent qu'une seule des formes précédentes prennent les mêmes dénominations; mais l'espèce prend le nom de dioïque quand les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portés par des pieds différents,

monoïques quand elles le sont par le même pied,

polygame si le même pied porte à la fois des fleurs mâles, des femelles et des hermaphrodites.

Enveloppes florales.

L'enveloppe la plus immédiate des organes essentiels devrait toujours porter le nom de Corolle quelle que soit sa couleur, quelle que forme qu'elle prenne. cependant on l'appelle souvent calice quand elle est verte,

écaille quand elle n'est formée que d'une lame sèche devant de support aux étamines ou aux pistils

bâle quand elle est formée de 2 écailles opposées l'une à l'autre

et chaque écaille porte le nom de valve

on réserve le nom de corolle à l'enveloppe immédiate des organes sexuels quand elle les entoure complétement et quand elle n'est pas verte.

Elle peut être d'une seule pièce et on la dit monopétale

ou de plusieurs pièces nommées pétales et on l'appelle alors polypétale

(di, tri, tetra, penta, hexa, déca-pétale selon qu'elle a 2, 3, 4, 5, 6, 10, &c)

Elle est régulière quand elle est disposée circulairement autour d'un point central d'où les diverses divisions de cette corolle sont également distantes,

irrégulière dans le cas contraire

On a donné des noms particuliers aux principales formes de corolle

ainsi la corolle monopétale régulière peut être.

en roue quand elle est presque plate

en soucoupe, (hypocratériformis) si les bords se relevent

Lith. de Vaillet-R. des arcis 17

en Cloche ou Campanulée quand son bord est très relevé en sorte qu'elle est plus haute que large

en Tube ou Tubuleuse lorsqu'elle est étroite et presqu'aussi large à un bout qu'à l'autre on nomme souvent ces fleurs fleurons

en Entonnoir ou Infundibuliforme si au haut du tube elle offre une portion élargie à laquelle on donne le nom de limbe, tandis qu'on appelle bord la circonférence, et gorge l'entrée du tube



on dit le bord ou le limbe entier s'ils n'offrent aucune sinuosité

ondulés s'ils ont des échancrures larges et arrondies mais peu profondes

Crénelés si ces ondulations sont petites

Dentés s'ils offrent des échancrures aigues et n'allant pas jusqu'à la moitié du limbe

Lobés quand ces divisions vont jusqu'à la moitié du limbe et sont arrondies

bi, tri, quadri, quinquefide si 2, 3, 4, 5 échancrures dépassent la moitié du limbe et sont aigues

bi tri quadri quinque partite si les 2, 3, 4, 5 échancrures sont si profondes que les divisions ne se tiennent plus que par leur base

La corolle peut être encor

à Ventre ou Ventrue quand le tube est renflé et le limbe fort petit

en Godet ou Urcéolée quand à un tube ventru se joint un limbe large

en Toupie ou Turbinée quand le tube est en œuf renversé

Les Corolles monopétales irrégulières peuvent être

Unilabiées quand un coté du limbe se prolonge en une lèvre

en Languette si cette lèvre dépasse en longueur le tube et on nomme souvent ces fleurs demi-fleurons



Bilabiées ou Labiées quand les 2 Côtés opposés du limbe se prolongent en lèvres l'une en bas ou inférieure, l'autre en haut ou Supérieure qui prend le nom de casque quand elle est recourbée au dessus de la lèvre inf.re



ou Mufle ou Personée quand avec 2 lèvres la corolle présente à sa gorge une bosselure qui en bouche l'entrée et à laquelle on a donné le nom de palais



Quelquefois le tube se prolonge en bas en une bosse ou une sorte de corne qu'on nomme Eperon. comme cette saillie s'ouvre en dedans de la corolle et renferme une humeur sucrée, on lui a donné à tort le nom de Nectaire.

Les fleurs en mufle qui par une singulière monstruosité deviennent régulières et présentent alors 5 éperons autour du tube sont appelées fleurs péloriées

Lith. Desailler R. des arcis 17





La corolle polypétale ou de plusieurs pièces est également régulière quand ses diverses pièces sont semblables entre elles, et disposées symétriquement. on l'appelle
en Croix ou Crucifère (ou mieux Cruciforme) quand elle est formée de 4 pétales en croix renfermant presque toujours 6 étamines tétradynames
en Rose ou Rosacée quand elle est formée de 5 pétales
on nomme Limbe la portion élargie du pétale
Onglet la portion retrécie par la quelle il s'attache à la fleur Limbe onglet
La corolle polypétale irrégulière ou anomale s'appelle Nectarifère quand elle a un ou plusieurs pétales prolongés en arrière en Eperons qui renferment presque toujours une humeur sucrée ou Nectar qui les a fait nommer improprement Nectaires.
Papilionacée quand elle est formée de 4 pièces, dont une supérieure grande, et enveloppant les autres au commencement, se nomme Etendard A
2 Latérales ou Ailes BB, et une inférieure ou Carène formée de deux pétales latéraux soudés ensemble par leur bord inférieur, et enveloppant les étamines.
Dans les autres formes de corolles polypétales anomales qui n'ont pas reçu de noms particuliers, si le pétale supérieur et médian se courbe par dessus la fleur, on le nomme Casque
Si le pétale inférieur et médian est très grand et plane on l'appelle Tablier casque tablier
on dit en Capuchon ou Cuculliformes les pétales fermés par leur bout libre
Enfin comme tous les organes planes les pétales peuvent être circulaires
Elliptiques, ovales, obovales, cordés, obcordés, Lancéolés,
Linéaires, hastés, Sagittés ou en flèche, Roncinés, Panduriformes, &c.
La place où la corolle s'insère, lui a valu, comme aux étamines, les épithètes d'hypogyne, périgyne, épigyne. Si les étamines s'insèrent sur elle, on la dit Staminifère.
Souvent par une monstruosité naturelle ou due à la culture, la corolle se double, C'est-à-dire qu'une seconde corolle se developpe entre la première et les étamines, ou que plus fréquemment les filets des étamines s'élargissent en prenant la forme de pétales, tandis que leurs anthères disparaissent. S'il reste encor des étamines intactes, la fleur n'est que semi double et peut donner des graines; mais si toutes les étamines ont subi cette transformation, la fleur est double et ne peut plus donner de graines. Si du centre ou des côtés de la corolle sort une autre fleur on appelle la première Prolifère Dans le 12e cahier nous parlerons du Calice.





N.B. Pour le choix des noms des plantes, nous sommes forcés de prendre ceux qu'elles portent dans le commerce de paris, et qui ne sont pas toujours ceux des botanistes, afin que les amateurs et les jardiniers puissent s'entendre avec les marchands; mais nous n'y attachons aucune importance même comme indices de genres. ceux ci sont devenus si variables que tels auteurs décrivent dans plusieurs genres ce que d'autres réunissent en une seule espèce!! et chaque nouvel ouvrage en bouleversant les genres multiplie ainsi à l'infini les noms d'une même plante. Qui aura le courage et le pouvoir d'arrêter ce déluge de noms?

[illegible] 8 ans arcis 17

Le Calice est l'enveloppe ordinairement verte qui recouvre d'abord la corolle, et la soutient. Les fleurs qui en manquent sont nommées Incomplètes, une fleur devant, pour être Complète avoir et corolle et calice. corolle calice



Quelquefois le calice est Commun, c'est à dire qu'il renferme plusieurs corolles.

on l'appelle Glume quand il est formé d'une ou plus souvent de deux écailles renfermant une ou plusieurs corolles également de 2 écailles ou valves, et appelées bâles bâles glume, chaque écaille porte le nom de valve.



Chaque pièce des calices ordinaires se nommant Sépale ou phylle, le calice d'une seule pièce est dit Monosépale ou monophylle, di, tri, tetra, penta, poly-sépale ou-phylle s'il est de 2, 3, 4, 5 ou plusieurs pièces

Les formes du calice monophylle sont celles de la corolle monopétale, ainsi il peut être en roue, en soucoupe, en cloche, en tube, en entonnoir, en godet, en toupie, on le dit en vessie ou Vésiculeux quand il est beaucoup plus large que la corolle son bord est entier c'est-à-dire sans échancrures ou ondulé ou crénelé ou denté ou lobé ou fendu en 2, 3, 4, 5, 6, bi-, tri-, quadri-, quinque-, sex-fide. S'il n'y a que 2 dents principales l'une en haut, l'autre en bas, on dit le calice à 2 lèvres ou bilabié, chaque lèvre pouvant être entière ou dentée

Les sépales du calice polyphylle ont les mêmes formes que les pétales, elliptiques, ovales, lanceolés, linéaires, &c.

Le calice est simple quand il n'est formé que d'un seul rang de pièces

Caliculé s'il est enveloppé à la base par un autre calice plus petit

Imbriqué s'il est formé de plusieurs écailles se recouvrant comme les tuiles d'un toit

Si les pièces sont disposées de telle sorte que le bord de l'une recouvre le bord de l'autre au moins dans le bouton on dit la fleuraison imbriquée

elle est valvée quand certaines pièces en recouvrent complètement d'autres



Comparées aux divisions de la corolle, celles du calice peuvent leur être Opposées c'est à dire leur correspondre, être en face

ou Alternes c'est à dire que les lobes de l'un correspondent aux fentes de l'autre.

si les pistils, les étamines, les pétales, et les sépales sont successivement alternes on dit la fleuraison en quinconce alors les pistils sont opposés aux pétales et les étamines aux sépales.

Les folioles appliquées au calice ou attachées soit au milieu soit à la base des pédoncules s'appellent Bractées.

Si les bractées forment un verticille distant du calice, on les nomme Collerette

Lith. desailler R. des arcis 17

Du Fruit

Le fruit est le résultat de l'ovaire que le pollen a fécondé, et qui se développe de plus en plus, jusqu'à l'époque où il peut, par son germe, reproduire la plante.

Comme pour la fleur, nous procéderons des parties essentielles ou centrales, aux parties enveloppantes ou accessoires.

Le Germe ou Embryon est la portion la plus essentielle, puisque c'est pour lui que se passent tous les phénomènes de la fleuraison, et qu'il est destiné à reproduire une plante entière.

Il est formé 1° d'une plumule ou gemmule (tige future) enveloppée dans 1 ou 2 feuilles dites primordiales qui ne ressemblent en rien aux autres feuilles de la plante



2° d'une radicule (racine future). Ces deux parties sont unies l'une à l'autre par 3° un nœud ou Collet, au dessus du quel s'insèrent

4° un, deux ou plusieurs corps charnus appelés Cotylédons

S'il y a un intervalle cylindrique entre le nœud et l'insertion des cotylédons on le nomme 5° Tigelle. Si cette tigelle s'allonge pendant la germination et entraine avec elle, hors de terre, les cotylédons, on donne à ceux-ci l'épithète d'Epigés. ils sont hypogés quand ils restent toujours sous terre.

Ces divers organes sont repliés dans la graine de manière que les cotylédons enveloppent tout le reste, tandisque les feuilles primordiales ne recouvrent que la plumule

Le Germe peut être selon sa position sur la plante 1° droit quand sa radicule est en bas (le fruit étant placé le pédoncule en bas.) 2° renversé quand sa radicule est en haut

selon sa direction il est rectiligne, c'est à dire en ligne droite, ou courbé

Il est souvent mais pas toujours, accompagné d'une masse albumineuse, Albumen, périsperme ou endosperme dont il occupe la circonférence, et on le dit extraire ou le centre et on le dit Intraire mais au quel il n'adhère par aucun vaisseaux.

Enfin ce germe est toujours caché dans une enveloppe ou tégument propre qui adhère aux organes accessoires par un gros vaisseau appelé cordon Ombilical qui laisse sur sa surface une cicatrice nommée hile



l'ensemble de ces diverses parties s'appelle Graine

La graine par sa forme peut être Sphérique ou en boule , ovoïdale ou en œuf turbinée ou en toupie , cylindrique , fusiforme ou en fuseau , cordiforme ou en cœur , réniforme ou en rein , comprimée quand le hile est sur le bord déprimée quand le hile est sur une face

par sa position elle est dressée si elle s'insère par sa partie inférieure au bas du fruit renversée si elle s'insère par en haut à la partie supérieure du fruit

ascendante si c'est par en bas qu'elle s'attache au côté du fruit

suspendue si c'est par en haut qu'elle s'attache à son côté

appendue si c'est par son milieu

La graine est toujours recouverte d'une enveloppe nommée Péricarpe mais cette enveloppe est quelquefois appliquée immédiatement sur chaque graine, ou même soudée avec son tégumen et ne s'ouvre jamais pour laisser sortir la graine mais tombe avec elle, en sorte qu'on croirait que celle-ci est sans péricarpe, ou nue.

Si le péricarpe est soudé à la graine, c'est une Cariopse

S'il ne lui est qu'appliqué immédiatement c'est un akène La réunion de plusieurs akènes autour d'un seul style s'appelle Polakène (Tetrakène quand il y en a 4)

Si la graine est entourée d'une enveloppe coriace garnie en bas d'une espèce de coupe c'est un Gland

Si elle est entourée d'une première enveloppe Endocarpe dure comme du bois, plongée dans une masse charnue celle ci se nomme Drupe, l'endocarpe Noyau et la graine Amande (Cerises, pêches.)

quand la masse charnue est verte, herbacée et d'un gout âpre on l'appelle Brou et le noyau prend le nom de Noix.

S'il y a plusieurs noyaux dans la même drupe, c'est une Nuculaine

Quand dans un péricarpe charnu il y a plusieurs graines entourées chacune d'une membrane ou endocarpe corné C'est une Pomme et les graines sont des pepins et s'il n'y a aucun endocarpe sensible, le péricarpe s'appelle Baie (raisin, groseille)

Si les graines ou pepins sont cartilagineuses et attachées à la membrane pariétale on nomme le fruit Péponide (Melon)

Les péricarpes secs ou non charnus, renfermant plusieurs graines prennent les noms de

Samares quand ils ne s'ouvrent pas, et n'ont qu'une cavité. elles sont souvent ailées

Carcérules quand ils ne s'ouvrent pas et ont plusieurs cavités ou loges

Follicules s'ils sont longs, et s'ouvrent par une fente longitudinale d'un seul côté,

Coques s'ils sont ovoïdes et s'ouvrent de même (chaque coque ne contient souvent qu'une graine)

L'Elatérie est la réunion de plusieurs coques, qui dans l'origine étaient soudées en un seul fruit



Siliques s'ils sont longs, s'ouvrent par une fente longitudinale de chaque coté, et sont séparés en deux cavités par une membrane longitudinale allant d'une fente à l'autre

Silicules quand avec la même organisation ils ne sont pas 1 fois ½ plus longs que larges

Légumes s'ils s'ouvrent de la même manière; mais sans cloison longitudinale (quelquefois il y a de petites cloisons transversales) d'autres fois il n'y a qu'une graine) les graines s'insérant du même coté mais alternativement à l'une et à l'autre pièce



si le légume est formé de plusieurs pièces articulées au bout les unes des autres on le dit lomentacé

Pyxides s'ils sont arrondis et s'ouvrent par une fente circulaire qui sépare complétement le sommet en une plaque comme un opercule

Capsules dans tous les autres cas.

Lith. Pelletier pass. du caire 37



La manière dont ces diverses espèces de fruits s'ouvre, s'appelle Déhiscence
S'ils ne s'ouvrent jamais (comme les Baies, les Carcérules) on les dit Indéhiscents. Alors la graine ne peut germer qu'après que le péricarpe a pourri par l'humidité.
S'ils s'ouvrent pour laisser échapper les graines, 1° par un ou plusieurs trous ou Pores formés à leur sommet ou à leur base, on dit le fruit uni-, bi-, tri-, quadri-, quinque-, ou multi-foraminé selon qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, ou plusieurs trous
2° par une ou plusieurs fentes n'allant pas jusqu'au milieu de la hauteur du fruit, ces fentes forment autant de dents qui couronnent le fruit qu'on dit alors uni-, bi-, tri-, quadri-, ou pluri-denté s'il y a 1, 2, 3, 4, ou plusieurs dents
3° par une ou plusieurs fentes allant jusqu'au bas du fruit, ces fentes forment autant de pièces séparées appelées Valves et le péricarpe est uni-, bi-, tri-, quadri-, quinque-, ou multi-valvé (et non Valve) s'il a 1, 2, 3, 4, 5, ou plusieurs valves
Sur le fruit pas encor mûr, l'endroit ou se formera chaque fente s'appelle Suture
on devrait appeler bi-, tri-, quadri-, quinque-, ou multifide, le péricarpe dont les 2, 3, 4, 5 ou plusieurs fentes dépassent la moitié de la hauteur, sans aller jusqu'à la base
L'Intérieur du fruit peut n'offrir qu'une seule cavité ou Loge il est dit alors uniloculaire ou être divisé en 2, 3, 4, 5, ou plusieurs compartiments ou loges par 1, 2, 3, 4 ou plusieurs Cloisons on le dit alors bi-, tri-, quadri-, quinque-, ou multiloculaire
Les Cloisons sont presque toujours longitudinales, c'est à dire, qu'allant de la base au sommet du fruit elles mettent les loges à coté les unes des autres ; mais quelquefois les cloisons sont transversales et les loges sont au dessus les unes des autres.
Les cloisons sont presque toujours complètes, c'est à dire qu'elles séparent complètement les loges l'une de l'autre mais quelquefois incomplètes, ce sont des demi-cloisons qui laissent les loges communiquer l'une avec l'autre par un point
Les cloisons peuvent être parallèles aux valves, et comme les fentes d'ouverture correspondent alors aux bords des valves, on dit le fruit Septicide
Si au contraire les cloisons sont perpendiculaires aux valves, les fentes répondent au milieu de la loge, et le fruit est loculicide
Chaque péricarpe, ou chaque loge peut ne contenir qu'une graine et on le, ou on la dit monosperme . Il ou Elle est di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, ou poly-sperme suivant qu'il ou qu'elle contient 2, 3, 4, 5, 6 ou plusieurs graines
Les points où les cordons ombilicaux s'insèrent au péricarpe s'appellent Placentas s'ils sont insérés sur une colonne formant l'axe du fruit et nommée Columelle, on dit le placenta columellaire . Il est valvaire si l'insertion a lieu sur les valves, pariétal si l'insertion a lieu sur les cloisons , dorsal si les graines s'attachent à l'opposé d'une fente unique comme dans quelques follicules.



Lith. Gallettier pas. du caire 36